



GUIDE ESPÈCES EN PÉRIL

De Sacré-Coeur
à Baie-Trinité





.....

AVANT-PROPOS

.....





.....

AVANT-PROPOS

.....



REMERCIEMENTS

Le Comité ZIP de la rive nord de l'estuaire tient à remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce guide, soit en révisant le contenu ou en fournissant des informations complémentaires ou des photos.

TEXTES & PHOTOS

- Pêches et Océans Canada
Viviane Haeberle, Sylvi Racine, Stella D.Ruddock
- Ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs
Stéphane Guérin, Daniel Poirier, Catherine Ayotte, Nathalie Desrosiers, Norman Dignard
- Ministère du Développement Durable, de la Lutte contre les Changements Climatiques
Mireille Bélanger

PHOTOS

- Stratégies Saint-Laurent
- Musée Canadien de la nature
- Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
- Dominic Francoeur
- Tourisme Côte-Nord Manicouagan
- Chauve-souris Québec
- Espace pour la vie | Biodôme, Les insectes du Québec | Yves Dubuc.

ÉQUIPE DU COMITÉ ZIP

- Marie-Pier Cloutier (directrice générale)
- Marie Karine Maltais (chargée de projet)
- Tessa Parisée (agente de projet)
- Maria-Camila Roy-Avilan (agente de projet et des communications)

Ce guide a été élaboré et distribué grâce à la contribution financière de la Fondation Alcoa pour l'environnement.



AVANT-PROPOS

Plusieurs connaissent la précarité du béluga, du rorqual bleu ou encore du rorqual commun, l'importance de l'aigle royal et du faucon pèlerin. Mais qui connaît l'état du carex des glaces, du râle jaune ou encore de l'anguille d'Amérique? Des espèces méconnues de la population sont en péril sur la Côte-Nord et bien peu de personnes pourraient les reconnaître si elles les apercevaient. Ce guide de terrain a pour but de vous aider à identifier les espèces sauvages au statut précaire au Québec et à vous indiquer les actions à prendre lorsque vous les rencontrez.

COMMENT UTILISER CE GUIDE ?

Le guide est divisé en 3 sections :

1

En première partie, vous retrouverez les codes de conduite et les bonnes pratiques à adopter lors de l'observation de la flore et de la faune. Vous retrouverez également une description des lois régissant les espèces en péril et des niveaux de protection correspondant aux différents statuts octroyés.

2

En deuxième partie, vous trouverez les fiches d'identification des espèces en péril regroupées en 5 catégories : les mammifères, les oiseaux, les poissons, les insectes et les plantes.

3

En troisième partie vous retrouverez des informations pratiques sur les instances à contacter lors de l'observation de ces espèces.

MISE EN GARDE ET MISES À JOUR



Il est à noter que la désignation des espèces et l'octroi des statuts de protection est un processus continu. Prière de consulter les différentes ressources proposées à même ce document, de même que le site Web du Comité ZIP de la rive nord de l'estuaire, afin de tenir votre carnet et vos connaissances à jour.

LE COMITÉ ZIP DE LA RIVE-NORD DE L'ESTUAIRE

Le Comité ZIP de la rive nord de l'estuaire (ZIP NRE) est un organisme de concertation et d'action travaillant pour la protection et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.

Les interventions du Comité ZIP RNE couvrent un territoire délimité par les municipalités de Sacré-Cœur et de Baie-Trinité.



L'ESTUAIRE MARITIME DU SAINT-LAURENT ET SA RIVE NORD

Comportant une grande diversité de milieux, tels les marais, les tourbières, les plages, les battures, les falaises rocheuses, les forêts et plusieurs autres, la rive nord de l'estuaire sert d'habitat pour de nombreuses espèces. Que ce soit le temps de leur migration saisonnière ou encore parce qu'elles sont bien implantées dans la région depuis longtemps, ces espèces utilisent les milieux naturels d'ici pour s'alimenter, s'abriter, se reproduire, etc. La combinaison de fonds marins peu profonds et d'une vallée sous-marine de 300 mètres de profondeur crée une diversité d'habitats pour la faune marine. D'où la présence d'un grand nombre d'espèces, dont la survie est fragile! Apprenez-en davantage sur ces espèces pour pouvoir mieux les protéger! Au nom de la loi....

LÉGISLATION FÉDÉRALE CONCERNANT LES ESPÈCES EN PÉRIL

La Loi sur les espèces en péril (LEP), adoptée en 2002, vise à « Prévenir la disparition des espèces sauvages du Canada, permettre le rétablissement de celles qui, par suite de l'activité humaine, sont devenues des espèces disparues du pays, en voie de disparition ou menacées et favoriser la gestion des espèces préoccupantes pour éviter qu'elles ne deviennent des espèces en voie de disparition ou menacées ». Elle détermine : la reconnaissance officielle de l'espèce et de son statut; l'identification et la protection de l'habitat essentiel de l'espèce; le droit d'intervenir si les provinces ne prennent pas de mesures assez fortes de protection.

LE COMITÉ ZIP DE LA RIVE-NORD DE L'ESTUAIRE

Pour être inscrite dans la loi, la situation d'une espèce doit être évaluée. Le Comité sur la Situation des Espèces en Péril du Canada (COSEPAC), composé de spécialistes, évalue et désigne les espèces sauvages en péril. Il agit en tant que comité consultatif indépendant auprès du gouvernement pour l'aider à déterminer quelles espèces doivent être incluses dans l'annexe 1 de la LEP. Ce ne sont pas toutes les espèces jugées en péril par le COSEPAC qui sont inscrites dans l'annexe 1 de la LEP. Une fois qu'une espèce est inscrite à l'Annexe 1 de la loi, des mesures obligatoires doivent être prises pour sa protection.

Si l'espèce est inscrite à l'Annexe 1 comme disparue du Canada, en voie de disparition ou menacée :

- Il est interdit de tuer, harceler, capturer, prendre ou nuire à un individu.
- Il est interdit d'endommager ou de détruire sa résidence ou son habitat essentiel.
- Il est obligatoire d'établir un programme de rétablissement de l'espèce.

Si l'espèce est inscrite à l'Annexe 1 comme préoccupante :

- Le ministère concerné doit élaborer un plan de gestion conforme à la loi.

LÉGISLATION PROVINCIALE CONCERNANT LES ESPÈCES EN PÉRIL

La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables a été adoptée en 1989. Elle a pour objectif «d'empêcher la disparition ou la diminution des espèces sauvages du Québec, de protéger leurs habitats et de favoriser le rétablissement des espèces en danger». Elle permet :

- De rendre officiel le statut des espèces en danger; 2 statuts officiels existent : les espèces menacées et les espèces vulnérables. Une liste d'espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables est également établie.
- De faire des études et d'obtenir des informations sur ces espèces et sur leurs habitats essentiels.
- De prendre des mesures pour protéger et favoriser le rétablissement de ces espèces.

Il est interdit de posséder (à l'extérieur de son milieu naturel), récolter, acquérir, céder et manipuler génétiquement une espèce floristique menacée ou vulnérable. Une fois qu'une espèce faunique est désignée menacée ou vulnérable, elle tombe sous la protection de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune.

LES STATUTS DE PROTECTION

Au fédéral, le COSEPAC donne un statut aux espèces sauvages. Les mêmes statuts sont utilisés pour inscrire les espèces à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril au Canada.

STATUT	DÉFINITIONS [COSEPAC, 2015]
Disparue	Elle n'existe plus
Disparue du pays	Elle n'existe plus à l'état sauvage au Canada, mais est présente ailleurs
En voie de disparition	Espèce sauvage exposée à une disparition de la planète ou à une disparition du pays imminente
Menacée	Elle est susceptible de devenir en voie de disparition si les facteurs limitants ne sont pas renversés
Préoccupante	Elle peut devenir une espèce menacée ou en voie de disparition à cause de l'accumulation des caractéristiques biologiques et des menaces reconnues qui pèsent sur elle
Non en péril	Elle ne risque pas de disparaître dans les circonstances actuelles
Données insuffisantes	Cette catégorie s'applique lorsque l'information disponible est insuffisante (a) pour déterminer l'admissibilité d'une espèce à l'évaluation ou (b) pour permettre une évaluation du risque de disparition de l'espèce.

Au Québec, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables octroie les statuts suivants :

STATUT	DÉFINITIONS
Menacée	La disparition de l'espèce est appréhendée
Vulnérable	La survie de l'espèce est jugée précaire, même si sa disparition n'est pas appréhendée à court ou à moyen terme
Susceptible	Espèce sauvage susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

Pour plus d'informations sur les processus de désignation, veuillez consulter :
Processus d'évaluation des espèces en péril par le COSEPAC: http://www.cosewic.gc.ca/fra/sct0/index_f.cfm
Le registre public des espèces en péril : <http://www.sararegistry.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=24F721TB-1>
Le MFFP : <http://mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/index.jsp>
Le MDDELCC: <http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/BIODIVERSITE/25-ans/index.htm>

BONNES PRATIQUES POUR L'OBSERVATION DES BALEINES

Le trafic maritime, la navigation de plaisance et les activités d'observation en mer peuvent déranger les mammifères marins en péril et nuire à leur rétablissement. Dans le Saint-Laurent, les baleines partagent leur habitat avec toutes sortes d'embarcations. Il est donc vital, pour favoriser leur survie, de respecter les bonnes pratiques d'observation suivantes :

BÉLUGA, RORQUAL BLEU, BALEINE NOIRE, RORQUAL COMMUN

- Ne les approchez pas. Respectez une distance de 400 mètres
- Réduisez votre vitesse et évitez les changements brusques de vitesse et de direction
- Si votre embarcation se trouve par inadvertance à moins de 400 mètres d'une baleine en péril, ralentissez et laissez passer l'animal, ou éloignez-vous lentement et avec vigilance pour ne pas le blesser avec l'hélice du moteur

SI UN BÉLUGA S'APPROCHE DE VOTRE EMBARCATION...!



En bateau : continuez de naviguer sans vous arrêter de manière à vous éloigner à plus de 400 mètres des bélugas tout en maintenant une vitesse constante entre 5 et 10 nœuds. Évitez de changer de direction à répétition. S'il est impossible de respecter une distance de 400 mètres, maintenez un cap.

En kayak : Ne vous arrêtez pas. Continuez de pagayer pour vous éloigner à plus de 400 mètres de tous les bélugas.

MARSOUINS ET DAUPHINS

- Ne passez pas à travers un groupe de marsouins ou de dauphins;
- S'ils décident de nager dans votre vague d'étrave, réduisez votre vitesse progressivement et évitez les changements rapides de direction.

Si vous êtes témoin d'une activité ou d'un comportement qui dérange les mammifères marins, communiquez avec **Braconnage-Alerte** de Pêches et Océans Canada sur Internet ou au **1-800-463-9057**.

Lorsqu'un mammifère marin est échoué, blessé ou empêtré dans un engin de pêche, vous pouvez alerter le **Réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins** au **1-877-722-5346**.

Rappelez-vous qu'à l'intérieur des limites du **Parc marin du Saguenay – Saint-Laurent**, des mesures réglementaires spécifiques s'appliquent à l'observation des mammifères marins : parcmarin.qc.ca.

CODE DE CONDUITE POUR L'OBSERVATION DES OISEAUX

On doit éviter de déranger les oiseaux. Il est donc essentiel de :

- ne pas effrayer ou pourchasser les oiseaux, ni les exposer au danger;
 - ne pas importuner les oiseaux pendant qu'ils se reposent, en particulier les oiseaux nocturnes durant le jour;
 - ne pas s'approcher des nids, ni perturber les oisillons ou leurs parents;
 - ne pas utiliser d'enregistrements sonores, ni imiter la voix des oiseaux lorsqu'ils sont en période de reproduction ou lorsque les conditions risquent de leur être néfastes;
 - ne pas amener chiens ou chats aux endroits fréquentés par les oiseaux.
-

On doit préserver les habitats des oiseaux. Il est donc essentiel de :

- demeurer dans les sentiers;
 - ne pas endommager la végétation;
 - ne pas déranger ni altérer les abords et le camouflage des nids;
 - ne pas laisser de déchets, même biodégradables, ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin.
-

On doit respecter les propriétés privées et publiques. Il est donc essentiel de :

- respecter les directives affichées;
 - obtenir la permission avant d'entrer sur une propriété privée;
 - laisser les entrées et les passages dégagés;
 - refermer les barrières et ne pas altérer les clôtures;
 - ne pas déranger les animaux de ferme ni piétiner les cultures;
 - communiquer vos observations aux personnes qui vous ont permis d'accéder à leur propriété.
-

On doit respecter les autres. Il est donc essentiel de :

- réduire les bruits incommodants, comme ceux des portières d'auto;
 - parler à voix basse et restreindre les conversations au minimum;
 - permettre à chacun d'observer les oiseaux et aider les personnes moins expérimentées;
 - traiter les autres avec courtoisie;
 - faire connaître ou rappeler les recommandations de ce Code de conduite, au besoin.
-

On doit faire preuve de discernement avant de diffuser la présence d'un oiseau. Il est donc essentiel de :

- bien évaluer si l'oiseau peut tolérer le dérangement causé par une affluence, en particulier en période de reproduction;
- bien évaluer si le site peut supporter une affluence de façon convenable et sécuritaire;
- ne pas divulguer la présence d'un oiseau qui se trouve sur un terrain privé sans avoir informé le propriétaire de l'affluence que cela risque d'entraîner et sans avoir obtenu son autorisation;
- ne pas hésiter à demander conseil à des personnes plus expérimentées avant de prendre la décision de diffuser la présence de l'oiseau.

GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE PÊCHE SPORTIVE

- Informez-vous sur les règlements en vigueur pour votre zone de pêche
- Toujours avoir son permis de pêche et en sa possession
- Évitez les poissons-appâts et favorisez l'utilisation de leurres artificiels en tout temps

.....

Si vous faites de la pêche avec remise à l'eau :

- Préparez bien votre matériel et ayez tout à portée de la main;
 - Utilisez des leurres artificiels, un hameçon simple;
 - Si l'utilisation de l'épuisette est nécessaire, privilégiez une épuisette à petites mailles sans nœud ;
 - Évitez de pêcher avec remise à l'eau si l'eau est trop chaude (plus de 21°C pour les salmonidés) ;
 - Limitez la durée du combat ;
 - Évitez la pêche en profondeur ou remontez le poisson lentement pour qu'il puisse s'adapter au changement de pression ;
 - Ne manipulez pas les branchies ou les yeux des poissons et limitez le plus possible le temps de vos manipulations ;
 - Limitez le temps d'exposition à l'air du poisson ;
 - Retirez délicatement l'hameçon ou coupez-le s'il n'est pas bien accessible ;
 - Laissez au poisson un temps immobile sous l'eau pour qu'il puisse récupérer ;
 - Visitez le site Internet du Ministère pour plus d'informations.
-



.....

MAMMIFÈRES

.....





.....

MAMMIFÈRES

.....



BALEINE NOIRE DE L'ATLANTIQUE NORD | *Eubalaena glacialis*

LEP : en voie de disparition

COSEPAC : en voie de disparition (2004)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

La baleine noire est une baleine à fanons. Comme son nom l'indique, elle est de couleur noire et peut mesurer jusqu'à 18 mètres de longueur. Elle peut parfois avoir des taches blanches au niveau de la gorge et du ventre. Elle a un corps massif, une très grosse tête et n'a pas de nageoire dorsale. Les pointes de sa queue sont de forme triangulaire. Son souffle est très distinctif : il a la forme d'un V bien net.

HABITAT

On la retrouve principalement dans les eaux côtières qu'elle utilise pour s'alimenter de zooplancton et de petits poissons (Réseau d'observation des Mammifères Marins, 2015; Pêches et Océans Canada, 2010). Cette baleine a été chassée au point de presque disparaître à la fin des années 1800. En 1935, la Société des Nations en a interdit la chasse dans tous les océans.

RÉPARTITION

Elle migre le long des côtes de l'Atlantique Nord du sud des États-Unis au golfe du Saint-Laurent. Il est très rare de l'observer dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Cependant, une observation récente a confirmé qu'il est possible de l'apercevoir tout le long de l'estuaire maritime, de Tadoussac à Baie-Trinité.

QUOI FAIRE



Si vous observez un individu :

- Contactez Urgences Mammifères Marins : 1-877-7baleine (1-877-722-5346)
- Prenez une photo si possible
- Notez le nombre d'individus, la date, l'heure et le lieu d'observation
- Soumettez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL)

Si vous rencontrez un individu alors que vous êtes en embarcation nautique :

- Diminuez votre vitesse et évitez de changer de direction brusquement
- Contournez l'individu en gardant une bonne distance
- Conservez une distance de 400 mètres, ne vous approchez pas
- Si vous êtes plus près par accident, arrêtez-vous et laissez passer l'animal (Pêches et Océans Canada, 2012)

RÉSEAU D'OBSERVATION DES MAMMIFÈRES MARINS. Baleine noire de l'Atlantique Nord (Baleine des Basques).

REGISTRE PUBLIC DES ESPÈCES EN PÉRIL. Programme de rétablissement de la baleine noire de l'Atlantique Nord. 2009.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Espèces aquatiques en péril - Baleine noire de l'Atlantique Nord.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Les bonnes pratiques pour l'observation des mammifères marins au Québec.

BÉLUGA | Delphinapterus leucas

(POPULATION DE L'ESTUAIRE DU SAINT-LAURENT)

LEP : menacée | COSEPAC : en voie de disparition (2014) | LEMV : menacée

IDENTIFICATION

Le béluga est une baleine à dents. Il n'a pas de nageoire dorsale et a une bosse sur la tête (nommée melon). Il a une petite tête courte. L'adulte est blanc mais les juvéniles sont gris ou bruns.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Le béluga se distingue par sa couleur blanche (chez les adultes), son absence de nageoire dorsale et sa taille (les adultes mesurent de 3 à 5 mètres de long).

RÉPARTITION

Il existe plusieurs populations de bélugas; celle du Saint-Laurent est la plus au sud. On retrouve le béluga du Saint-Laurent tout le long de l'estuaire maritime, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. L'été, il préfère le sud de l'estuaire moyen, l'estuaire maritime et le Saguenay, jusqu'à la hauteur de Forestville. L'hiver, on croit qu'il se déplace davantage vers le golfe du Saint-Laurent.

HABITAT

La population de l'estuaire du Saint-Laurent est isolée des autres populations de bélugas. En été, les femelles et leurs veaux préfèrent les eaux saumâtres et chaudes de l'estuaire moyen. On connaît peu leur habitat hivernal. Les bélugas se nourrissent de poissons, de crustacés et de vers marins. (Réseau d'Observation des Mammifères Marins, 2015 ; Pêches et Océans Canada, 2015)

QUOI FAIRE



Si vous observez un individu :

- Notez le nombre d'individus, la date et l'heure et le lieu de la manière la plus précise possible
- Rapportez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent :
 - Rapportez votre observation même si vous n'avez pas de photo ou que vous n'êtes pas certain de l'identification.

Si vous rencontrez un individu alors que vous êtes en embarcation nautique :

- Diminuez votre vitesse. Évitez l'individu en gardant une bonne distance, au moins 400m
- Ne vous approchez pas
- Si vous êtes plus près par accident, éloignez-vous prudemment
- Ne jamais traverser un groupe d'individus avec votre embarcation (Pêches et Océans Canada, 2016)

Si vous apercevez un mammifère marin en difficulté, une carcasse ou encore si vous avez une collision avec un individu, contactez Urgences Mammifères Marins au 1-877-722-5346.

PLAN D'ACTION SAINT-LAURENT. Fiches de suivi. Le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent, 3e éd., 2015.

RÉSEAU D'OBSERVATION DES MAMMIFÈRES MARINS. Béluga (Marsouin blanc).

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Les bonnes pratiques pour l'observation des mammifères marins au Québec.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA – Espèces en péril : le béluga du Saint-Laurent.

ÉPAULARD | *Orcinus orca*

(POPULATION DE L'ATLANTIQUE NORD-OUEST ET DE L'EST DE L'ARCTIQUE)

LEP : À l'étude | COSEPAC : préoccupante (2008) | LEMV : aucun statut

IDENTIFICATION

L'épaulard est une baleine à dents. Il a le dos, les flancs et les nageoires de couleur noire et le ventre blanc. Il a également une tache ovale blanche près de l'œil. Il a une grande et longue nageoire dorsale positionnée au milieu de son dos.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

La distinction entre le noir et le blanc de sa peau est nette et non en dégradé. Il possède également une tache grise en forme de demi-lune derrière la nageoire dorsale. Nage souvent en groupe et peut sauter hors de l'eau ou exposer sa tête ou sa queue.

RÉPARTITION

L'épaulard est présent dans l'Arctique et dans les eaux côtières de Terre-Neuve. Il est très rare dans l'estuaire maritime. Des observations isolées ont quand même été réalisées à quelques reprises confirmant sa présence dans les eaux du Saint-Laurent.

HABITAT

Ils peuvent occuper des milieux très différents les uns des autres et s'adaptent bien aux variations de température et de salinité. Ils mangent principalement du poisson. (COSEPAC, 2008; Pêches et Océans Canada, 2006; ROMM, 2015)

QUOI FAIRE



Si vous apercevez un individu :

- Prenez en note la date, l'heure et le lieu de la manière la plus précise possible.
- Prenez une photo si possible
- Notez le nombre d'individus
- Soumettez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL).

Si vous rencontrez un individu en embarcation nautique :

- Diminuez votre vitesse et évitez de changer de direction brusquement
- Contournez l'individu en gardant une bonne distance
- Conservez une distance de 400 mètres, ne vous approchez pas
- Si vous êtes plus près par accident, arrêtez-vous et laissez passer l'animal (Pêches et Océans Canada, 2012)

Si vous apercevez un mammifère marin en difficulté, une carcasse ou encore si vous avez une collision avec un individu, contactez Urgences Mammifères Marins au 1-877-722-5346.

COSEPAC. 2008. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur l'épaulard (*Orcinus orca*), population résidente du sud, population résidente du nord, population migratrice de la côte Ouest, population océanique et populations de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique, au Canada – Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. ix + 70 p.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Espèces aquatiques en péril - Épaulard (population de l'Atlantique Nord-Ouest et de l'est de l'Arctique).

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Les bonnes pratiques pour l'observation des mammifères marins au Québec.

RÉSEAU D'OBSERVATION DES MAMMIFÈRES MARINS. Épaulard (Orque).

MARSOUIN COMMUN | *Phocoena phocoena*

(POPULATION DE L'ATLANTIQUE NORD-OUEST)

LEP : À l'étude | COSEPAC : préoccupante (2006) | LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Le marsouin commun est une baleine à dents. C'est la plus petite baleine qu'il est possible d'observer dans l'estuaire maritime (1.5-2m). Il a une petite tête arrondie, sans bec. Il a le dos gris-noir, le ventre blanc, les cotés gris-blanc et a une ligne noire de la bouche aux nageoires pectorales. Il a une nageoire dorsale triangulaire située au milieu du dos. Son souffle est presque invisible, mais peut être entendu.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Sa nageoire dorsale a la forme d'un triangle, avec le dos de la nageoire droit ou très peu concave. Il est très petit et vif et il saute rarement hors de l'eau.

RÉPARTITION

On les retrouve tout le long de l'estuaire du Saint-Laurent de juin à septembre. Ils sont plus nombreux dans le golfe, mais remontent jusqu'à l'embouchure du Saguenay.

HABITAT

En été, ils se tiennent sur les plateaux continentaux de l'hémisphère nord, souvent près des rives et dans les baies. (COSEPAC, 2006; FCF, 2015; ROMM, 2015; Pêches et Océans Canada, 2008)

QUOI FAIRE



Si vous apercevez un individu :

- Prendre une photo
- Notez le nombre d'individus, la date et l'heure et le lieu de la manière la plus précise possible
- Rapportez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent
 - Rapportez votre observation même si vous n'avez pas de photo ou que vous n'êtes pas certain de l'identification.

Si vous rencontrez un individu en embarcation nautique :

- Diminuez votre vitesse et éviter de changer de direction brusquement
- Contournez l'individu en gardant une bonne distance
- Conservez une distance de 400 mètres, ne vous approchez pas
- Si vous êtes plus près par accident, arrêtez-vous et laissez passer l'animal (Pêches et Océans Canada, 2012)

Si vous apercevez un mammifère marin en difficulté, une carcasse ou encore si vous avez une collision avec un individu, contactez Urgences Mammifères Marins au 1-877-722-5346.

COSEPAC. 2006. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le marsouin commun (*Phocoena phocoena*) (population de l'Atlantique Nord-Ouest) au Canada – Mise à jour. Comité sur le statut des espèces en péril au Canada. Ottawa. viii + 38 p.

FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE. Faune et flore du pays – Le marsouin commun.

RÉSEAU D'OBSERVATION DES MAMMIFÈRES MARINS. Marsouin commun (Pourcil).

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Espèces aquatiques en péril – Marsouin commun (population de l'Atlantique Nord-Ouest).

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Les bonnes pratiques pour l'observation des mammifères marins au Québec.

RORQUAL BLEU | *Balaenoptera musculus* (POPULATION DE L'ATLANTIQUE)

LEP : en voie de disparition | COSEPAC : en voie de disparition (2012) | LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

C'est le plus gros animal de la planète, il mesure entre 24 et 30 mètres de long. Le rorqual bleu est une baleine à fanons. Il a une petite nageoire dorsale placée vers l'arrière du corps et des nageoires pectorales pointues. Le dos de la nageoire dorsale est droit ou légèrement incurvé. Il a la peau gris-bleu, parfois avec un motif de taches gris pâle. Son souffle peut faire un jet jusqu'à 9 m de hauteur.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Son apparition est longue; on voit son souffle, son dos et encore son dos avant de voir sa petite nageoire dorsale. Il sort sa queue de temps en temps. Son souffle, qui a de 6 à 12 m de haut, est très impressionnant.

RÉPARTITION

La population de l'Atlantique Nord-Ouest, dans l'Estuaire maritime et le golfe Saint-Laurent, est principalement observée de mai à décembre. On peut voir des rorquals bleus jusqu'à la hauteur de Tadoussac.

HABITAT

Il fréquente la rive nord de l'estuaire pour s'alimenter de krill dans les zones de remontées d'eau froide le long des côtes. (Beauchamp et al., 2009; Pêches et Océans Canada, 2013; Registre Public sur les Espèces en Péril, 2015; ROMM, 2015)

QUOI FAIRE



Si vous apercevez un individu :

- Prenez une photo si possible
- Notez le nombre d'individus, la date, l'heure et le lieu d'observation
- Soumettez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL)

Si vous rencontrez un individu en embarcation nautique :

- Diminuez votre vitesse et évitez de changer de direction brusquement
- Contournez l'individu en gardant une bonne distance
- Conservez une distance de 400 mètres, ne vous approchez pas
- Si vous êtes plus près par accident, arrêtez-vous et laissez passer l'animal (Pêches et Océans Canada, 2012)

Si vous apercevez un mammifère marin en difficulté, une carcasse ou encore si vous avez une collision avec un individu, contactez Urgences Mammifères Marins au 1-877-722-5346.

RORQUAL COMMUN | Balaenoptera physalus

(POPULATION DE L'ATLANTIQUE)

LEP : préoccupante | COSEPAC : préoccupante (2005) | LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

C'est le deuxième plus gros animal de la planète (22-27 m). Son dos a une couleur allant du brun au gris foncé, son ventre et le dessous de ses nageoires sont blancs. Sa nageoire dorsale est en forme de triangle et placée au 2/3 de son dos. Il montre très rarement la queue.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Son corps est mince et allongé. Il a le menton gris d'un côté et blanc de l'autre. Sa nageoire dorsale est pointue et son souffle peut monter jusqu'à 5 m.

RÉPARTITION

Est présent de mai à septembre dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent où il s'alimente. Il migre ensuite vers des zones plus tempérées.

HABITAT

Se tient dans les eaux côtières et principalement dans les zones riches en plancton et en petits poissons (les zones où il y a des remontées d'eau en provenance des profondeurs). (Baleines en direct, 2015; COSEPAC, 2005; MFFP, 2001; Pêches et Océans Canada, 2013; ROMM, 2015)

Si vous apercevez un individu :

- Prenez une photo si possible
- Prenez en note la date, l'heure et le lieu de la manière la plus précise possible
- Notez le nombre d'individus
- Soumettez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL)

QUOI FAIRE



Si vous rencontrez un individu en embarcation nautique :

- Diminuez votre vitesse et évitez de changer de direction brusquement
- Contournez l'individu en gardant une bonne distance
- Conservez une distance de 400 mètres, ne vous approchez pas
- Si vous êtes plus près par accident, arrêtez-vous et laissez passer l'animal (Pêches et Océans Canada, 2012)

Si vous apercevez un mammifère marin en difficulté, une carcasse ou encore si vous avez une collision avec un individu, contactez Urgences Mammifères Marins au 1-877-722-5346.

BALEINES EN DIRECT. Rorqual commun.

COSEPAC 2005. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le rorqual commun Balaenoptera physalus au Canada – Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vii + 43 p.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Rorqual commun.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Espèces aquatiques en péril – Rorqual commun (Atlantique).

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Les bonnes pratiques pour l'observation des mammifères marins au Québec.

RÉSEAU D'OBSERVATION DES MAMMIFÈRES MARINS. Rorqual commun (baleine à fanons).

CAMPAGNOL DES ROCHERS | *Microtus chrotorrhinus*

LEP : aucun

COSEPAC : aucun

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit mammifère au dos brun et au ventre gris. Il a le museau et la croupe orange-roux. Sur son museau, la couleur devient de moins en moins forte vers le dos et les flancs, cédant la place au brun. Sa queue est beaucoup plus courte que son corps.

RÉPARTITION

Cette espèce pourrait être observée sur toute la rive nord de l'estuaire, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. Cette espèce est rare et se retrouve en faible densité sur le territoire.

HABITAT

Vit dans les falaises, affleurements rocheux et prairies adjacentes à ceux-ci. (Desrosiers, Morin et Jutras, 2002; Duhamel et Tremblay, 2013; Lepage, 2001; Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, 2001)

QUOI FAIRE

Vous croyez avoir vu un campagnol des rochers?



- Prenez en note la date, l'heure et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec (CDPNQ)
 - Remplissez le formulaire en ligne via leur site web

DESROSIERS, N., R. MORIN ET J. JUTRAS. 2002. Atlas des micromammifères du Québec. Société de la faune et des parcs du Québec. Direction du développement de la faune. Québec. 92 p.

DUHAMEL, R. ET J. A. TREMBLAY, 2013. Rapport sur la situation du campagnol des rochers (*Microtus chrotorrhinus*) au Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, Direction générale de l'expertise sur la faune et ses habitats, 22 pages.

LEPAGE, M., 2001. La faune vertébrée menacée ou vulnérable en forêt boréale. La société Provancher d'histoire naturelle du Canada. Le naturaliste Canadien, 125:3, pages 131-137.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Campagnol des rochers.

CAMPAGNOL-LEMMING DE COOPER | *Synaptomys cooperi*

LEP : aucun statut

COSEPAC : aucun statut

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit mammifère (12 cm), similaire à une souris, brun sur le dos et les flans et gris sur le ventre. En hiver, son pelage devient plus dense et gris. Il a un court museau et une courte queue. Ses incisives ont une rayure sur le sens de la longueur. Il creuse un terrier de 10-15 cm de profondeur dans lequel il construit son nid.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Au nord de l'estuaire (Baie-Trinité), les deux espèces peuvent se côtoyer. Elles sont très similaires, mais le campagnol-lemming boréal a une tache de poil roux à la base des oreilles et a les incisives plus larges.

RÉPARTITION

Sur la rive nord de l'estuaire, on peut le retrouver de Sacré-Cœur à Baie-Trinité en faible densité. Il y est au nord de son aire de répartition.

HABITAT

Il fréquente les tourbières à sphaignes (mousses) et à éricacées (bleuet, kalmia, thé du Labrador, etc.), les marais herbeux et les forêts mixtes autour de ces milieux humides. (Desrosiers, Morin et Jutras, 2002; Fortin, Rousseau et Grimard, 2004; MFFP, 2001)

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date, l'heure et le lieu de la manière la plus précise possible.
- Prenez une photo si possible.
- Rapportez votre observation au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ), remplissez le formulaire en ligne.

DESROSIERS, N., R. MORIN ET J. JUTRAS. 2002. Atlas des micromammifères du Québec. Société de la faune et des parcs du Québec. Direction du développement de la faune. Québec. 92 p.

FORTIN, C., ROUSSEAU J. ET GRIMARD, M., 2004. Extension de l'aire de répartition du campagnol-lemming de Cooper (*Synaptomys cooperi*) : mentions les plus nordiques. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada.

LE NATURALISTE CANADIEN, 128:2, pages 35-37.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Campagnol-lemming de Cooper.

CHAUVE-SOURIS ARGENTÉE | Lasionycteris noctivagans

LEP : aucun | COSEPAC : aucun | LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Elle a un grand corps pouvant atteindre 11 cm et ses ailes ont une bonne envergure (jusqu'à 31 cm). Elle a un pelage foncé, noir ou brun, et le bout de ses poils du dos a une teinte argentée. Son pelage se prolonge jusqu'au milieu de la membrane qui relie ses 2 pattes arrière. Elle a les oreilles noires et arrondies.

RÉPARTITION

La chauve-souris argentée est migratrice. Elle est présente au Québec de mai à septembre. La Côte-Nord se trouve au nord de son aire de répartition. Il est plus probable de la retrouver au sud de l'estuaire, soit entre Sacré-Cœur et Forestville.

HABITAT

C'est une espèce assez solitaire qui fréquente les forêts, près des plans d'eau. Elle s'abrite en hauteur, sous l'écorce des arbres ou dans les trous de pics abandonnés. Pour plus d'information, visitez le site chauves-souris aux abris. (Jutras et al., 2012; MFFP, 2015; Tremblay et Jutras, 2010)

Vous observez une colonie estivale de chauve-souris? Rendez-vous sur le site Web chauve-souris.ca pour enregistrer votre colonie.

Le mieux à faire pour les aider c'est :

- de les laisser tranquille
- Éviter de procéder à des travaux de rénovation ou d'exclusion pendant la période d'élevage des jeunes
- de ne pas utiliser de pesticides sur les pelouses ou dans les jardins/potagers. Ceux-ci contaminent les insectes, qui sont leur source d'alimentation
- Construire des abris pour chauve-souris (consultez le site web aidonsleschauves-souris.ca)

Si vous observez des chauves-souris actives en hiver, en plein jour ou des chauves-souris mortes, signalez-le au ministère via le numéro sans frais 1 877 346-6763.

QUOI FAIRE



! Attention ! Les chauves-souris peuvent être porteuses du virus de la rage.

Évitez de toucher une chauve-souris à main nue. Toujours porter des gants épais si vous êtes dans l'obligation de déplacer une chauve-souris. Utilisez un contenant et un carton pour récupérer la chauve-souris et évitez tout contact. Si une personne a eu un contact physique avec une chauve-souris, conservez l'animal emprisonné en lieu sûr; lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes; contactez Info-Santé - 8-1-1. Si votre animal de compagnie a eu un contact avec la chauve-souris, vous devez communiquer avec votre vétérinaire.

FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE. Faune et flore du pays – La petite chauve-souris brune.

JUTRAS, J., DELORME, M., MC DUFF, J. ET C. VASSEUR, 2012. Le suivi des chauves-souris du Québec. La société Provancher d'histoire naturelle du Québec. Le Naturaliste Canadien, 136 :1, pages 48-52.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Chauve-souris argentée.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Fiches individuelles d'animaux inopportuns.

TREMBLAY, J. A. ET JUTRAS, J., 2010. Les chauves-souris arboricoles en situation précaire au Québec – Synthèse et perspectives. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. Le Naturaliste Canadien, 134:1. Pages 29 à 40.

CHAUVÉ-SOURIS CENDRÉE | *Lasiurus cinereus*

LEP : aucun | COSEPAC : aucun | LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Cette chauve-souris est la plus grosse du Québec. Elle a le pelage brun pâle avec le bout des poils argenté. Le pelage de sa gorge et autour de la face est de couleur jaune. Elle a les oreilles courtes et arrondies avec une ligne noire en bordure.

RÉPARTITION

Étant migratrice, cette chauve-souris se trouve au Québec seulement de mai à septembre. Sur la rive nord de l'estuaire, elle utilise tout le territoire en été. Il est donc possible de la retrouver de Sacré-Cœur jusqu'à Baie-Trinité.

HABITAT

Elle s'abrite dans les forêts de conifères et de feuillus où elle utilise la cime des arbres comme sites de repos et d'élevage des petits. Elle chasse dans les ouvertures forestières et les territoires de coupe près des plans d'eau. (Jutras et al., 2012; MFFP, 2001; Tremblay et Jutras, 2010)

Vous observez une colonie estivale de chauve-souris? Rendez-vous sur le site Web chauve-souris.ca pour enregistrer votre colonie.

Le mieux à faire pour les aider c'est :

- de les laisser tranquille
- Éviter de procéder à des travaux de rénovation ou d'exclusion pendant la période d'élevage des jeunes
- de ne pas utiliser de pesticides sur les pelouses ou dans les jardins/potagers. Ceux-ci contaminent les insectes, qui sont leur source d'alimentation
- Construire des abris pour chauve-souris (consultez le site web aidonsleschauves-souris.ca)

Si vous observez des chauves-souris actives en hiver, en plein jour ou des chauves-souris mortes, signalez-le au ministère via le numéro sans frais 1 877 346-6763.

QUOI FAIRE



! Attention ! Les chauves-souris peuvent être porteuses du virus de la rage.

Évitez de toucher une chauve-souris à main nue. Toujours porter des gants épais si vous êtes dans l'obligation de déplacer une chauve-souris. Utilisez un contenant et un carton pour récupérer la chauve-souris et évitez tout contact. Si une personne a eu un contact physique avec une chauve-souris, conservez l'animal emprisonné en lieu sûr; lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes; contactez Info-Santé - 8-1-1. Si votre animal de compagnie a eu un contact avec la chauve-souris, vous devez communiquer avec votre vétérinaire.

FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE. Faune et flore du pays – La petite chauve-souris brune.

JUTRAS, J., DELORME, M., MC DUFF, J. ET C. VASSEUR, 2012. Le suivi des chauves-souris du Québec. La société Provancher d'histoire naturelle du Québec. Le Naturaliste Canadien, 136 :1, pages 48-52.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Chauve-souris cendrée.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Fiches individuelles d'animaux inopportuns.

TREMBLAY, J. A. ET JUTRAS, J., 2010. Les chauves-souris arboricoles en situation précaire au Québec – Synthèse et perspectives. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. Le Naturaliste Canadien, 134:1. Pages 29 à 40.

CHAUVE-SOURIS NORDIQUE | *Myotis septentrionalis*

LEP : en voie de disparition | COSEPAC : en voie de disparition (2013) | LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Chauve-souris au pelage brun foncé sauf au niveau du ventre, où il prend plutôt une couleur jaunâtre. Elle a de grandes oreilles.

RÉPARTITION

Sur la rive nord de l'estuaire, cette chauve-souris se retrouve à la limite nordique de son aire de répartition. Elle se retrouve donc surtout au sud de l'estuaire maritime, soit au sud de Forestville.

HABITAT

Cette espèce vit principalement en forêt boréale, se réfugiant sous l'écorce ou dans des cavités d'arbres. Elle hiberne l'automne dans des cavités à l'abri des intempéries (grottes, cavernes dans les rochers, sous l'écorce d'arbres, etc.) (COSEPAC, 2013; Jutras et al., 2012; Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs, 2015; Tremblay et Jutras, 2010)

Vous observez une colonie estivale de chauve-souris? Rendez-vous sur le site Web chauve-souris.ca pour enregistrer votre colonie.

Le mieux à faire pour les aider c'est :

- de les laisser tranquille
- Éviter de procéder à des travaux de rénovation ou d'exclusion pendant la période d'élevage des jeunes
- de ne pas utiliser de pesticides sur les pelouses ou dans les jardins/potagers. Ceux-ci contaminent les insectes, qui sont leur source d'alimentation
- Construire des abris pour chauve-souris (consultez le site web aidonsleschauves-souris.ca)

Si vous observez des chauves-souris actives en hiver, en plein jour ou des chauves-souris mortes, signalez-le au ministère via le numéro sans frais 1 877 346-6763.

QUOI FAIRE



! Attention ! Les chauves-souris peuvent être porteuses du virus de la rage.

Évitez de toucher une chauve-souris à main nue. Toujours porter des gants épais si vous êtes dans l'obligation de déplacer une chauve-souris. Utilisez un contenant et un carton pour récupérer la chauve-souris et évitez tout contact. Si une personne a eu un contact physique avec une chauve-souris, conservez l'animal emprisonné en lieu sûr; lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes; contactez Info-Santé - 8-1-1. Si votre animal de compagnie a eu un contact avec la chauve-souris, vous devez communiquer avec votre vétérinaire.

COSEPAC. 2013. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la petite chauve-souris brune (*Myotis lucifugus*), chauve-souris nordique (*Myotis septentrionalis*) et la pipistrelle de l'Est (*Perimyotis subflavus*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xxviii + 104 p.

FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE. Faune et flore du pays – La petite chauve-souris brune.

JUTRAS, J., DELORME, M., Mc DUFF, J. ET C. VASSEUR, 2012. Le suivi des chauves-souris du Québec. La société Provancher d'histoire naturelle du Québec. Le Naturaliste Canadien, 136 :1, pages 48-52.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Chauve-souris nordique.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Fiches individuelles d'animaux inopportuns.

TREMBLAY, J. A. ET JUTRAS, J., 2010. Les chauves-souris arboricoles en situation précaire au Québec – Synthèse et perspectives. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. Le Naturaliste Canadien, 134:1. Pages 29 à 40.

CHAUVE-SOURIS ROUSSE | *Lasiurus borealis*

LEP : aucun statut | COSEPAC : aucun statut | LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Le mâle a une couleur pouvant aller du roux au rouge et la femelle, du jaune au brun clair. L'extrémité des poils du dos, de la poitrine et des épaules est blanchâtre et forme une bande plus pâle autour du cou. Les oreilles n'ont pas de contour noir.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Au sud de l'estuaire, la chauve-souris rousse peut être confondue avec la chauve-souris cendrée. Cette dernière a une bande noire sur le contour de ses oreilles.

RÉPARTITION

Étant migratrice, elle est présente au Québec de mai à septembre. Il est possible de l'apercevoir tout le long de l'estuaire maritime.

HABITAT

Se retrouve principalement dans les forêts de conifères et les forêts mixtes. (Jutras et al., 2012; Lévesque et Tremblay, 2008; MFFP, 2001; Tremblay et Jutras, 2010)

Vous observez une colonie estivale de chauve-souris? Rendez-vous sur le site Web chauve-souris.ca pour enregistrer votre colonie.

Le mieux à faire pour les aider c'est :

- de les laisser tranquille
- Éviter de procéder à des travaux de rénovation ou d'exclusion pendant la période d'élevage des jeunes
- de ne pas utiliser de pesticides sur les pelouses ou dans les jardins/potagers. Ceux-ci contaminent les insectes, qui sont leur source d'alimentation
- Construire des abris pour chauve-souris (consultez le site web aidonsleschauves-souris.ca)

Si vous observez des chauves-souris actives en hiver, en plein jour ou des chauves-souris mortes, signalez-le au ministère via le numéro sans frais 1 877 346-6763.

QUOI FAIRE



! Attention ! Les chauves-souris peuvent être porteuses du virus de la rage.

Évitez de toucher une chauve-souris à main nue. Toujours porter des gants épais si vous êtes dans l'obligation de déplacer une chauve-souris. Utilisez un contenant et un carton pour récupérer la chauve-souris et évitez tout contact. Si une personne a eu un contact physique avec une chauve-souris, conservez l'animal emprisonné en lieu sûr; lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes; contactez Info-Santé - 8-1-1. Si votre animal de compagnie a eu un contact avec la chauve-souris, vous devez communiquer avec votre vétérinaire.

FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE. Faune et flore du pays – La petite chauve-souris brune.

JUTRAS, J., DELORME, M., MC DUFF, J. ET C. VASSEUR, 2012. Le suivi des chauves-souris du Québec. La société Provancher d'histoire naturelle du Québec. Le Naturaliste Canadien, 136 :1, pages 48-52.

LÉVESQUE, A. ET J.A. TREMBLAY. 2008. Rapport sur la situation de la chauve-souris rousse (*Lasiurus borealis*) au Québec. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Faune Québec. 26 pages.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Chauve-souris rousse.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Fiches individuelles d'animaux inopportuns.

TREMBLAY, J. A. ET JUTRAS, J., 2010. Les chauves-souris arboricoles en situation précaire au Québec – Synthèse et perspectives. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. Le Naturaliste Canadien, 134:1. Pages 29 à 40.

PETITE CHAUVE-SOURIS BRUNE | *Myotis lucifugus*

LEP : en voie de disparition | COSEPAC : en voie de disparition (2013) | LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Comme son nom l'indique, cette petite chauve-souris a le pelage brun, pouvant aller du pâle au foncé. Elle a quelques longs poils au niveau du pied qui s'étendent jusqu'à ses griffes et parfois plus.

RÉPARTITION

C'est une espèce commune au Québec. Il est possible de l'observer tout le long de la rive nord de l'estuaire (de Sacré-Cœur à Baie-Trinité).

HABITAT

En été, elles peuvent se retrouver en forêt ou encore dans des infrastructures humaines (greniers, chalets, murs, etc.). Elles chassent au dessus de l'eau. Elles passent l'hiver en hibernation dans des endroits protégés des intempéries (mines abandonnées, grottes, cavernes etc.). (COSEPAC, 2013; FCF, 2015; Jutras et al., 2012; MFFP, 2015; Tremblay et Jutras, 2010)

Les petites chauves-souris brunes sont fortement touchées par le syndrome du museau blanc, une infection fongique qui les affecte pendant leur période d'hibernation. Suite à l'introduction de ce champignon en Amérique du Nord, les populations de petites chauves-souris brunes subissent un déclin drastique.

Vous observez une colonie estivale de chauve-souris? Rendez-vous sur le site Web chauve-souris.ca pour enregistrer votre colonie.

QUOI FAIRE



Le mieux à faire pour les aider c'est :

- de les laisser tranquille
- Éviter de procéder à des travaux de rénovation ou d'exclusion pendant la période d'élevage des jeunes
- de ne pas utiliser de pesticides sur les pelouses ou dans les jardins/potagers. Ceux-ci contaminent les insectes, qui sont leur source d'alimentation
- Construire des abris pour chauve-souris (consultez le site web aidonsleschauves-souris.ca)

Si vous observez des chauves-souris actives en hiver, en plein jour ou des chauves-souris mortes, signalez-le au ministère via le numéro sans frais 1 877 346-6763.



! Attention ! Les chauves-souris peuvent être porteuses du virus de la rage.

Évitez de toucher une chauve-souris à main nue. Toujours porter des gants épais si vous êtes dans l'obligation de déplacer une chauve-souris. Utilisez un contenant et un carton pour récupérer la chauve-souris et évitez tout contact. Si une personne a eu un contact physique avec une chauve-souris, conservez l'animal emprisonné en lieu sûr; lavez-vous bien les mains avec de l'eau et du savon pendant 15 minutes; contactez Info-Santé - 8-1-1. Si votre animal de compagnie a eu un contact avec la chauve-souris, vous devez communiquer avec votre vétérinaire.

COSEPAC. 2013. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la petite chauve-souris brune (*Myotis lucifugus*), chauve-souris nordique (*Myotis septentrionalis*) et la pipistrelle de l'Est (*Perimyotis subflavus*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xxviii + 104 p.

FÉDÉRATION CANADIENNE DE LA FAUNE. Faune et flore du pays – La petite chauve-souris brune.

JUTRAS, J., DELORME, M., MC DUFF, J. ET C. VASSEUR, 2012. Le suivi des chauves-souris du Québec. La société Provancher d'histoire naturelle du Québec. Le Naturaliste Canadien, 136 :1, pages 48-52.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Chauve-souris nordique.

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. Fiches individuelles d'animaux inopportuns.

TREMBLAY, J. A. ET JUTRAS, J., 2010. Les chauves-souris arboricoles en situation précaire au Québec – Synthèse et perspectives. Société Provancher d'histoire naturelle du Canada. Le Naturaliste Canadien, 134:1. Pages 29 à 40.

COUGAR | Puma concolor

LEP : aucun statut | COSEPA : aucun statut | LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

En Amérique du Nord, la longueur totale du corps du mâle est légèrement supérieure à 2 mètres. Ce félin à poil ras a une couleur uniforme tournant autour du roux, brun, gris. Le bout de la queue et le derrière des oreilles sont noirs. Ses pattes avant ont 5 doigts et ses pattes arrière n'en ont que 4. Il laisse des traces de griffes sur les arbres pour marquer son territoire. Les petits naissent tachetés de noir, mais cette coloration se perd au cours de leur première année. Le cougar est très difficile à apercevoir. On remarque plutôt ses traces de pattes et sa queue qui peut parfois laisser une marque (ou traînée) dans la neige ou la boue.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Le cougar est plus gros et a une longue queue tandis que les lynx ont une queue très courte.

RÉPARTITION

Historiquement, le cougar se retrouvait partout sur notre territoire. Aujourd'hui, un manque de données de cette espèce ne nous permet pas de déterminer exactement son aire de répartition. Cette espèce pourrait hypothétiquement se retrouver sur la rive nord de l'estuaire.

HABITAT

Les cougars ont de très grands domaines vitaux et fréquentent de nombreux territoires. Ils utilisent principalement des terrains boisés avec une végétation importante où l'on retrouve des proies qu'il peut chasser (cerfs de Virginie, faons d'orignaux, castors, lièvres, etc.). (FCF, 2015; MFFP, 2006)

QUOI FAIRE



Vous croyez avoir vu un cougar?

- Communiquez avec le bureau de gestion de la faune au 1-877-346-6763
- Prenez en note la date, l'heure et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec (CDPNQ) en remplissant le formulaire en ligne

LOUP DE L'EST | *Canis lupus lycaon*

LEP : préoccupante

COSEPAC : menacée (2015)

LEMV : aucun statut

IDENTIFICATION

Il est plutôt petit et a le pelage couleur fauve, noir sur le dos et les flancs et roux derrière les oreilles. Les mâles adultes pèsent de 25 à 35 kilogrammes, et les femelles, de 20 à 30 kilogrammes.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Le coyote est plus petit que le loup de l'Est et est moins trapu. Le poids maximal d'un coyote est de 23 kg alors que celui du loup de l'Est est de 35 kg. Le coyote a la fourrure plus gris-doré et son museau est plus étroit. Quant au loup des bois, il pèse entre 18 et 42 kg et possède un pelage blanc à noir, généralement gris cendré avec le bout de la queue noire.

RÉPARTITION

En de très rares occasions, il occupe une bande étroite tout le long du fleuve Saint-Laurent jusqu'au golfe. Le loup qui est généralement observé est le loup des bois.

HABITAT

Le loup de l'Est fréquente les milieux forestiers où il peut chasser ses proies (cerf de virginie, orignal, castor, etc.) (FCF, 2015; Registre Public des Espèces en Péril, 2015)

QUOI FAIRE



Les loups sont sensibles aux perturbations anthropiques de leur habitat et au surpiégeage. Informez-vous!

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide.

CHAUVE-SOURIS ROUSSE



(c) Jérémy Froidevaux et François Fabianek - source chauve-souris.ca

CHAUVE-SOURIS CENDRÉE



(c) Biodôme de Montreal - M. B. Fenton source Espace pour la vie

CHAUVE-SOURIS ARGENTÉE



(c) Musée canadien de la nature

CHAUVE-SOURIS NORDIQUE



(c) Musée canadien de la nature

PETITE CHAUVE-SOURIS BRUNE



(c) Musée canadien de la nature

CAMPAGNOL LEMMING DE COOPER



(c) Musée canadien de la nature

MARSOUIN COMMUN




(c) Musée canadien de la nature

BALEINE NOIRE DE L'ATLANTIQUE



(c) Musée canadien de la nature

BÉLUGA



(c) Musée canadien de la nature

ÉPAULARD



(c) Musée canadien de la nature

RORQUAL BLEU



(c) Musée canadien de la nature

CAMPAGNOL DES ROCHERS



Rock Vole (*Microtus chrotomileus*)

(c) Musée canadien de la nature

LOUP



(c) Jacques Tournel source ATRM

COUGAR



Photo : Jardin Zoologique du Québec



.....

OISEAUX

.....





.....

OISEAUX

.....



AIGLE ROYAL | *Aquila chrysaetos*

LEP : aucun | COSEPAC : non en péril (1996) | LEMV : vulnérable

IDENTIFICATION

Grand rapace qui peut atteindre plus de 2 mètres d'envergure lorsque ses ailes sont déployées. Il a un plumage brun foncé avec une tache dorée sur la nuque. Le nid est composé de branches, d'herbes et de mousse et peut avoir un diamètre de plusieurs mètres. Les œufs sont blancs avec des taches brunes. Il y a normalement 2 œufs dans un nid.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Jeune pygargue à tête blanche: Au stade juvénile, l'aigle royal a une tache blanche sous chaque aile et une bande pâle à la base de la queue bien visibles lorsqu'il plane. Il a également, tout comme l'adulte, la nuque plus pâle que le corps. Le jeune pygargue peut avoir le dessous des ailes et de la queue tachetés de blanc, mais sans tache ou bande définie. Il a la tête de la même couleur que le corps. Les plumes des pattes de l'aigle le distinguent aussi du pygargue qui n'en a pas. **Buse pattue :** Les ailes ouvertes de l'aigle mesurent plus de 2 mètres tandis que celles de la buse ne dépassent pas 1 m 50. La buse est principalement blanche sous les ailes.

RÉPARTITION

L'aigle royal est bien présent le long de l'estuaire maritime. On peut l'observer de Tadoussac jusqu'à Baie-Trinité.

HABITAT

Il niche habituellement sur les corniches des falaises et cherche les terrains montagneux pour chasser. On le retrouve aussi dans la forêt boréale. (MFFP, 2010; MFFP, 2015)

L'aigle est très sensible à la présence humaine. Le dérangement et le piégeage accidentel sont des menaces pour cette espèce. **Il est interdit de tuer un aigle royal au Québec.** Vous apercevez un aigle royal?

- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec
 - Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

QUOI FAIRE



Vous apercevez un nid ?

- Ne vous en approchez pas, surtout entre avril et juillet
- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763

Vous entrez en collision/trappez/captez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763
- **Il est obligatoire de déclarer la capture accidentelle d'un aigle royal et il n'y a aucune sanction reliée.**

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide! (DTGQ, 2014 ; MFFP, 2010)

FÉDÉRATION DES TRAPPEURS GESTIONNAIRES DU QUÉBEC. 2014. Les aigles et le piégeage – Comment éviter les captures accidentelles ?

MINISTÈRE DE LA FORÊT, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec – Aigle royal.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2015. Gros plan sur la faune – Aigle royal.

FAUCON PÈLERIN | *Falco peregrinus*

LEP : préoccupante

COSEPAC : préoccupante (2007)

LEMV : vulnérable

IDENTIFICATION

Rapace de la taille d'une grosse corneille. Il a le dos du corps gris-ardoise et le ventre beige-blanc avec des lignes noires sur les pattes et les flancs et des taches noires sur le ventre. Seul son cou est plus uni et comporte moins de taches. Sous les ailes, il est blanc rayé de noir. Il porte une « moustache » foncée dans le visage. Il a les ailes pointues quand il vole.

RÉPARTITION

Le faucon pèlerin est bien présent le long de l'estuaire maritime. On peut l'observer de Tadoussac jusqu'à Baie-Trinité.

HABITAT

Il fait son nid sur les corniches des falaises, surtout près d'un plan d'eau. Il fréquente les milieux ouverts, comme les étendues humides, les lacs et rivières pour chasser.

QUOI FAIRE



Vous apercevez un faucon pèlerin?

- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec
 - Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

Vous apercevez un nid ?

- Ne vous en approchez pas, surtout entre avril et juillet
- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763
- **Il est obligatoire de déclarer la capture accidentelle d'un faucon pèlerin et il n'y a aucune sanction reliée.**

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC 2007. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) de la sous-espèce pealei (*Falco peregrinus pealei*) et anatum/tundrius (*Falco peregrinus anatum/tundrius*) au Canada – Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. viii + 55 p.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec – Faucon pèlerin anatum.

HIBOU DES MARAIS | Asio flammeus

LEP : préoccupante

COSEPAC : préoccupante (2008)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Hibou au dos brun et à la poitrine rayée blanc et noir. Il a le bout des ailes noir et de grandes taches noires sous les ailes qui permettent de l'identifier lorsqu'il est en vol. Au niveau du visage, il a le contour des yeux sombre accentuant le jaune de ses yeux.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Busard Saint-Martin : Le busard (mâle et femelle) a une bande blanche à la base de la queue. **Hibou Moyen-Duc** : L'hibou moyen-duc a de longues aigrettes (les «oreilles» du hibou sont en fait des plumes dressées) et un plumage plus foncé et plus strié.

RÉPARTITION

Plusieurs observations ont été réalisées le long de la rive nord de l'estuaire.

HABITAT

Il fréquente les milieux ouverts où il peut chasser les petits rongeurs, à la base de son alimentation : marais, prairies, champs agricoles, etc. (COSEPAC, 2008; MFFP, 2010; Nature Canada, 2015)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un hibou des marais?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec
 - Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2008. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur l'Hibou des marais (Asio flammeus) au Canada – Mise à jour. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vii + 28 p.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec – Hibou des marais.

NATURE CANADA. 2015. Aperçu espèce : l'Hibou des marais.

PYGARGUE À TÊTE BLANCHE

Haliaeetus leucocephalus

LEP : aucun statut

COSEPAC : non en péril (1984)

LEMV : vulnérable

IDENTIFICATION

C'est un grand rapace dont l'envergure des ailes peut atteindre 2,5 mètres une fois celles-ci déployées. L'adulte a la tête et la queue blanches et a le bec jaune vif. Le juvénile est brun foncé et a le bec sombre. Le nid est composé de branches et est très gros, pouvant mesurer 2,5 m de diamètre et jusqu'à 4 m de profondeur. Le pygargue pond habituellement 2 œufs.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Aigle royal : Le jeune pygargue a la tête et le corps de couleur uniforme (l'aigle a une tache dorée sur la nuque). Vu d'en dessous, le jeune pygargue peut avoir le dessous des ailes et de la queue tachetées de blanc, mais sans tache ou bande définie.

RÉPARTITION

Le pygargue à tête blanche est bien présent le long de l'estuaire maritime. On peut l'observer de Tadoussac jusqu'à Baie-Trinité. Très présent le long du fleuve et des autres cours d'eau.

HABITAT

Va construire son nid dans les grands arbres de forêts matures à proximité d'un cours d'eau. Il se nourrit principalement de poisson lorsque celui-ci est disponible. (MFFP, 2010)

Le pygargue à tête blanche est très sensible à la présence humaine. Le dérangement et le piégeage accidentel sont des menaces pour cette espèce. **Il est interdit de tuer un pygargue à tête blanche au Québec.** Vous apercevez un pygargue à tête blanche?

- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec
 - Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

QUOI FAIRE



Vous apercevez un nid ?

- Ne vous en approchez pas, surtout entre avril et juin
- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763
- **Il est obligatoire de déclarer la capture accidentelle d'un pygargue et il n'y a aucune sanction reliée.**

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide! (DTGQ, 2014 ; MFFP, 2010)

FÉDÉRATION DES TRAPPEURS GESTIONNAIRES DU QUÉBEC. 2014. Les aigles et le piégeage – Comment éviter les captures accidentelles ?

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec – Pygargue à tête blanche

ARLEQUIN PLONGEUR | *Histrionicus histrionicus*

LEP : préoccupante | COSEPAC : préoccupante | LEMV : vulnérable (2013)

IDENTIFICATION

La femelle est brune et a la poitrine pâle. Elle a une tache plus pâle entre les yeux et le bec et une tache blanche ronde sur la tête derrière les yeux. Le mâle est gris ardoise avec plusieurs lignes/points blancs sur le corps. Il a une grande tache couleur rouille sur les flancs et une ligne de la même couleur sur le dessus de la tête. Son patron de couleurs et de taches le distingue facilement des autres espèces. Les nids sont construits à même le sol, sur une corniche de falaise ou dans un tronc ou une souche et sont garnis de duvet. Les nids comportent 3 à 8 œufs.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Macreuses femelles : Le bec des macreuses est plus gros que celui de l'arlequin. **Femelle petit garrot** : Le petit garrot n'a qu'une tache à la tête et a une tache blanche caractéristique sur l'aile.

RÉPARTITION

N'est vraiment pas fréquent sur la rive nord de l'estuaire. Il a été observé occasionnellement à Tadoussac, Forestville et Baie-Comeau, mais pourrait être observé ailleurs.

HABITAT

Fréquente les eaux agitées et les courants forts dans les zones côtières pour se nourrir. Va faire son nid à proximité de l'eau, sur les falaises, corniches ou îles. [COSEPAC, 2013; MFFP, 2010]

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un arlequin plongeur?

- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec
 - Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

QUOI FAIRE



Vous apercevez un nid ?

- Ne vous en approchez pas
- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?
Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2013. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur l'Arlequin plongeur (*Histrionicus histrionicus*) population de l'Est au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xi + 42 p. (Registre public des espèces en péril site Web).

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec – Arlequin plongeur.

GARROT D'ISLANDE | *Bucephala islandica*

(POPULATION DE L'EST)

LEP : préoccupante | COSEPAC : préoccupante (2011) | LEMV : vulnérable

IDENTIFICATION

Mâle : Il a les flancs blancs et le dessus du corps noir avec plusieurs taches blanches sur le dessus des ailes. Sa tête est noire avec des reflets violacés et il a une tache blanche en forme de croissant entre le bec et l'œil. Femelle : Elle a le corps brun pâle et la tête brun foncé. Son bec est orange vif au printemps/hiver.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Garrot à œil d'or : Le mâle de ce dernier a la tête noire avec des reflets verts et la tache blanche de son visage est de forme ronde. Les deux femelles sont très similaires, la forme de la tête varie un peu et la femelle garrot d'Islande a le bec orange vif en hiver et au printemps.

RÉPARTITION

Il a été observé dans plusieurs milieux tout le long de l'estuaire maritime du fleuve Saint-Laurent.

HABITAT

Il se reproduit dans la forêt boréale au nord de l'estuaire et du golfe et ne niche pas nécessairement proche de l'eau. Il fréquente les zones rocheuses sous l'influence des marées où l'on retrouve des algues brunes, habitat de petits crustacés et gastéropodes, dont se nourrit le garrot. (COSEPAC, 2000; Environnement Canada, 2013; MFFP, 2010)

QUOI FAIRE



Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un garrot d'Islande?

- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

- Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2000. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Garrot d'Islande (*Bucephala islandica*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada, Ottawa. vii + 70 p.

ENVIRONNEMENT CANADA. 2013. Plan de gestion du Garrot d'Islande (*Bucephala islandica*), population de l'Est, au Canada. Série de Plans de gestion de la Loi sur les espèces en péril, Environnement Canada, Ottawa, iv + 16 pages.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables – Garrot d'Islande, population de l'Est.

GRÈBE ESCLAVON | Podiceps auritus

(POPULATION DE L'OUEST)

LEP : aucun

COSEPAC : préoccupante (2009)

LEMV : menacée

IDENTIFICATION

En été, il a la tête et le dos noirs. Sur la tête, il a un large sourcil doré qui se prolonge et lui donne l'air d'avoir des cornes de cette couleur. Son cou et côtés du corps sont brun-roux. En hiver, il reprend son plumage noir et blanc : le dessus du corps noir et le dessous blanc. Le noir de la tête arrête à la hauteur de l'œil. Il pond de 3 à 8 œufs blancs, bruns ou bleu-vert.

RÉPARTITION

Cet oiseau niche plus dans l'ouest du Canada, mais il fréquente le Saint-Laurent lors de sa migration automnale. Il est donc possible de l'observer pendant cette période.

HABITAT

Bien qu'il fréquente les lacs et milieux humides d'eau douce en été, on le retrouve le long des cours d'eau salée en hiver. Sur la rive nord de l'estuaire, il fréquente principalement les baies et les côtes. (Environnement Canada, 2015; MFFP, 2010)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un grèbe esclavon?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec
 - Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?
Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

ENVIRONNEMENT CANADA. 2015. Plan d'Action pour le Grèbe esclavon (Podiceps auritus), population des îles de la Madeleine, au Canada. Série de Plans d'action de la Loi sur les espèces en péril. Environnement Canada, Ottawa. iv + 15 p.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec – Grèbe esclavon.

BRUANT DE NELSON | *Ammodramus nelsoni*

LEP : aucun

COSEPAC : non en péril (1998)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit oiseau (quinzaine de centimètres) au dos brun, il a des rayures noires sur les côtés et la poitrine et son ventre est blanc. Il a les joues grises entourées de jaune.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Bruant des prés : Les joues grises du bruant de Nelson sont entourées de jaune alors que le bruant des prés n'a qu'un sourcil jaunâtre.

Bruant de le conte : Le bruant de le conte n'a pas de rayures sur la poitrine, elles arrêtent aux flans.

RÉPARTITION

On le retrouve dans les marais salés tout le long de l'estuaire maritime.

HABITAT

Habite principalement les marais salés le long des littoraux. (MFFP, 2001)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un bruant de Nelson?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec
 - Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

ENGOULEVENT BOIS-POURRI | *Antrostomus vociferus*

LEP : menacée

COSEPAC : menacée (2009)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit oiseau (24 cm) brun tacheté de noir et de blanc. La queue du mâle, une fois déployée a deux taches blanches sur les côtés. Le bout des ailes déployées est plutôt arrondi. Il pond généralement deux œufs blancs tachetés de brun.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Engoulement d'Amérique : L'engoulement d'Amérique a une ligne blanche sur chaque aile. Elles sont bien visibles lorsque les ailes sont ouvertes. Le bout des ailes déployées est pointu. Il a la queue encochée en forme de v.

RÉPARTITION

Il a été observé au sud de la rive nord de l'estuaire, soit dans la région de Tadoussac. Cette espèce se retrouve davantage au sud de la province.

HABITAT

Milieux ouverts, en bordure de forêts ou dans les forêts où la densité d'arbres n'est pas grande. On le retrouve aussi dans les milieux arbustifs et dans certains milieux humides. (COSEPAC, 2009)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un engoulement bois-pourri?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec
 - Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?
Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

ENGOULEVENT D'AMÉRIQUE | Chordeiles minor

LEP : menacée

COSEPAC : menacée (2007)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit oiseau (24 cm) gris-brun tacheté de noir et de blanc. Il a une bande blanche sur chaque aile et ses ailes déployées sont pointues. Il pond généralement deux œufs blancs fortement tachetés de brun, directement sur le sol.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Engoulevent bois-pourri : L'engoulevent d'Amérique a une ligne blanche sur chaque aile qui est absente chez l'engoulevent bois-pourri. Aussi, ce dernier n'a pas l'encoche en forme de v de la queue de l'engoulevent d'Amérique.

RÉPARTITION

Il est possible de l'observer tout le long de la rive nord de l'estuaire, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité.

HABITAT

Il fréquente les milieux ouverts avec peu de végétation au sol (plages, dunes, zones forestières ayant subi un feu, etc.).
(COSEPAC, 2007)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un engoulevent d'Amérique?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec
 - Créez un compte via le portail www.ebird.quebec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?
Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

GOGLU DES PRÉS

Dolichonyx oryzivorus

LEP : aucun

COSEPAC : menacée (2010)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

En été, le mâle est noir uni au dessous du corps et au visage, il a le milieu du dos blanc et une large tache blanche sur chaque aile. Sur sa tête, il a une grande tache de couleur crème. La femelle est d'une couleur beige rayée de brun, son ventre est plus pâle. En hiver, le mâle prend les mêmes couleurs que la femelle.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Carouge à épaulettes femelle : Cette dernière est fortement rayée sur le bas du corps. **Bruant noir et blanc** : Ce dernier n'a du blanc que sur les ailes et non sur le dos. Le bruant noir et blanc est peu fréquent sur la rive nord de l'estuaire.

RÉPARTITION

Bien qu'elle se trouve au nord de son aire de répartition, cette espèce est bien présente sur la rive nord de l'estuaire. On la retrouve de Sacré-Cœur à Baie-Trinité.

HABITAT

On le retrouve dans les champs, tourbières, prairies maritimes et marais où il y a des herbes hautes. (COSEPAC, 2010)

QUOI FAIRE

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un goglu des prés?



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

GRIVE DE BICKNELL | Catharus bicknelli

LEP : menacée

COSEPAC : menacée (2009)

LEMV : vulnérable

IDENTIFICATION

C'est un petit oiseau au dos gris terne et à la poitrine blanche mouchetée de noir. Son nid est composé de 3-4 œufs bleu-vert tachetés de brun.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Grive à joues grises : Ces deux espèces sont très similaires. La grive de Bicknell est plus petite, a les ailes moins longues et a le dos et la queue de couleur brune et non vert olive.

RÉPARTITION

Observations très occasionnelles et ponctuelles de cette espèce sur la rive nord de l'estuaire.

HABITAT

Dans les zones côtières, il fréquente les milieux forestiers denses peuplés de sapins ou d'épinettes. (COSEPAC, 2009; MFFP, 2010)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un grive de Bicknell?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2009. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la grive de Bicknell (Catharus bicknelli) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vii + 46 p.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec – Grive de Bicknell.

GRIVE DES BOIS | *Hylocichla mustelina*

LEP : aucun

COSEPAC : menacée [2012]

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Dos brun rouille tirant vers le roux au dessus de la tête, ventre et flancs de couleur pâle avec de multiples taches noires.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Autres grives : Tête rousse et plus grosses taches sur la poitrine qui descendent jusqu'aux pattes ou presque. **Moqueur roux :** Le moqueur a la queue et le bec plus longs que la grive. Il a l'œil jaune alors que la grive a l'œil foncé.

RÉPARTITION

Très occasionnelle sur la rive nord de l'estuaire, son aire de répartition de trouve plus au sud. Elle a été observée surtout dans les secteurs de Tadoussac et de Baie-Comeau.

HABITAT

Elle fréquente les forêts humides, principalement feuillues et mixtes. Elle peut également fréquenter les marécages et milieux humides à proximité des cours d'eau. (COSEPAC, 2012)

QUOI FAIRE

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un grive des bois?



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

HIRONDELLE DE RIVAGE | *Riparia riparia*

LEP : aucun

COSEPAC : menacée (2013)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Dos brun et reste du corps pâle. On la distingue bien des autres hirondelles par le « collier » brun sur sa poitrine formé par les prolongations de la couleur brune de ses flans qui se joignent à la hauteur de son cou.

RÉPARTITION

Peu fréquente sur la rive nord de l'estuaire, l'hirondelle de rivage a tout de même été observée de manière ponctuelle le long du Saint-Laurent.

HABITAT

Elle vit à proximité de milieux humides, rivières, fleuves, marais, etc. Pour nicher, elle utilise des rivages, et surtout des falaises, composés de matériaux friables comme le sable ou le limon. (COSEPAC, 2013; Oiseaux.net, 2015)

QUOI FAIRE



Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez une hirondelle de rivage?

- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible.
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

HIRONDELLE RUSTIQUE | Hirundo rustica

LEP : aucun

COSEPAC : menacée [2011]

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Dessus du corps bleu métallique et bas du corps brun ou beige pâle. A le visage et le cou brun-roux foncé. A la queue très échancrée (en forme de V). Le nid est formé de boulettes de boue et a la forme d'un bol.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Hirondelle à front blanc : La forme de la queue est très caractéristique : l'hirondelle à front blanc ne présente pas l'échancrure de l'hirondelle rustique. Le nid de l'hirondelle à front blanc a plutôt la forme d'une gourde, avec l'ouverture très petite.

RÉPARTITION

Sa présence a été observée tout le long de la rive nord de l'estuaire, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité.

HABITAT

Fréquente les milieux habités par l'homme et fait son nid sur les constructions ou encore dans les falaises en milieu naturel. Pour se nourrir, elle visite les étendues ouvertes, comme les champs, marais, tourbières et les berges des cours d'eau. (COSEPAC, 2011; MFFP, 2011)

QUOI FAIRE

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez une hirondelle rustique?



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2011. COSEWIC assessment and status report on the Barn Swallow *Hirundo rustica* Canada. Committee on the Status of Endangered Wildlife in Canada. Ottawa. ix + 37 pp.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2011. Animaux inopportuns – dommages causés par la faune.

MARTINET RAMONEUR

Chaetura pelagica

LEP : menacée

COSEPAC : menacée (2007)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit oiseau brun foncé avec la gorge plus pâle. Ses ailes le rendent facile à identifier. Elles sont longues et étroites, paraissant trop longues pour son corps, et sont pointues. Sa queue est très petite. Quand les ailes sont repliées, elles dépassent la queue de beaucoup.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Hirondelles : Les hirondelles ont une queue plus longue ou égale à leurs ailes une fois celles-ci repliées. **Étourneau sansonnet** : L'étourneau sansonnet a un bec bien visible alors que ce n'est pas le cas chez le martinet ramoneur. Le nid du martinet ramoneur est collé directement à une paroi alors que celui de l'étourneau est déposé sur une surface horizontale.

RÉPARTITION

Sur la rive nord de l'Estuaire, il se trouve au nord de sa zone de répartition. On l'observe principalement autour de Tadoussac et des Bergeronnes.

HABITAT

Étant insectivore, on le retrouve souvent autour des plans d'eau, autour desquels il s'alimente, et dans les milieux urbains et ruraux où il y a des cheminées disponibles pour qu'il niche. [COSEPAC, 2007; Regroupement QuébecOiseaux, 2013]

QUOI FAIRE



Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un martinet ramoneur?

- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?
Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2007. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Martinet ramoneur (Chaetura pelagica) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. viii + 56 p.

REGROUPEMENT QUÉBEC-OISEAUX. 2013. Connaître et protéger le martinet ramoneur, cet oiseau dans votre cheminée.

MOUCHEROLLE À CÔTÉS OLIVE

| Contopus cooperi

LEP : menacée

COSEPAC : menacée (2007)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit oiseau au dos du corps vert olive foncé tirant sur le gris-brun. Il a le ventre et le centre de la poitrine blancs. Il fait souvent son nid dans un conifère et pond en moyenne 3 œufs.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Pioui de l'Est : Le moucherolle a une tache blanche au bas de l'aile qui le distingue du pioui. Le pioui a toute la poitrine pâle alors que le moucherolle a les côtés lignés de noir.

RÉPARTITION

Est observé de manière ponctuelle tout le long de la rive nord de l'estuaire, de Tadoussac à Baie-Trinité.

HABITAT

Zones ouvertes avec présence de chicots à proximité de la forêt : lisières, brulis, milieux humides, etc. (COSEPAC, 2007)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un moucherolle à côtés olive?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

PARULINE DU CANADA | *Wilsonia canadensis*

LEP : menacée

COSEPAC : menacée [2008]

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit oiseau au ventre jaune vif et au dos gris uniforme. Le mâle a des taches noires bien prononcées autour du cou en forme de collier de perles. Les femelles les ont aussi, mais elles sont beaucoup moins foncées, parfois à peine visibles. Tous les individus ont une ligne jaune reliant les yeux au bec. Il pond de 4 à 5 œufs.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Son dos uni, sans tache, le distingue des autres oiseaux lui ressemblant. La ligne jaune de l'œil, lui donne l'air d'avoir des lunettes, est aussi caractéristique.

RÉPARTITION

Oiseau bien présent le long de la rive nord de l'estuaire. Il est observé de Tadoussac à Baie-Trinité.

HABITAT

Fréquente principalement les milieux forestiers ou les zones ouvertes à proximité de forêts. [COSEPAC, 2008; Les amis de la tourbière de St-Joachim-de-Shefford, s.d.]

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez une paruline du Canada?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?
Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

PIOUI DE L'EST | Contopus virens

LEP : aucun

COSEPAC : préoccupante (2012)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Il a le dos et le dessus de la tête gris-vert olive et le bas du corps beige-gris pâle. Il est possible de voir sur ses ailes deux étroites lignes blanches. Il va pondre en moyenne 3 œufs.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Moucherolles : ses lignes blanches sur les ailes et l'absence d'anneau blanc autour de ses yeux permettent de le distinguer des moucherolles lui ressemblant.

RÉPARTITION

Sa présence a été observée de manière ponctuelle le long de la rive nord de l'estuaire, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité.

HABITAT

C'est une espèce forestière. On peut la retrouver également en lisière de forêt. (COSEPAC, 2012)

QUOI FAIRE



Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un pioui de l'est?

- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

PLUVIER SIFFLEUR | Charadrius melodus

LEP : en voie de disparition

COSEPAC : en voie de disparition (2013)

LEMV : menacée

IDENTIFICATION

Petit oiseau de rivage, il a la tête et le dessus du corps couleur sable et le dessous du corps blanc. En été, il a une bande noire au bas du cou qui lui donne l'air d'avoir un collier, la bande peut être complète ou pas. Il a également une ligne noire qui relie les deux yeux. Ce sont les seuls attributs foncés sur sa tête. Son bec est orange avec le bout noir. Ils pondent normalement 4 œufs.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Pluvier semipalmé : Le pluvier semipalmé est plus sombre que le pluvier siffleur. **Pluvier kildir** : Le pluvier kildir est plus gros et a 2 colliers noirs autour du cou.

RÉPARTITION

Il ne nicherait actuellement que sur les plages des Îles de la Madeleine, mais aurait niché par le passé sur la rive nord de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Des observations occasionnelles ont été faites sur la rive nord de l'estuaire. Il ne passe pas l'hiver au Québec.

HABITAT

Il fréquente et niche sur les rives sableuses (plages de sable ou de galets, flèche littorale, îles, etc.). (COSEPAC, 2013; MFFP, 2010)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un pluvier siffleur?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/captez un individu involontairement ?
Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2013. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le Pluvier siffleur de la sous-espèce circumcinctus (Charadrius melodus circumcinctus) et de la sous-espèce melodus (Charadrius melodus) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xv + 43 p.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables – Pluvier siffleur.

QUISCALE ROUILLEUX | *Euphagus carolinus*

LEP : préoccupante

COSEPAC : préoccupante (2006)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

En été, le mâle a un plumage complètement noir brillant avec de faibles reflets verts sur le corps et violets sur la tête. La femelle a plutôt une couleur grise et brune. En hiver, ils prennent une couleur brun rouille.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Quiscale bronzé : En été, le quiscale bronzé a une forte coloration violet métallique sur la tête et un reflet doré sur le restant du corps. Il est plus gros que le quiscale rouilleux.

RÉPARTITION

On le retrouve sur toute la rive nord de l'estuaire, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité.

HABITAT

Fréquente surtout les milieux humides de la forêt boréale. Il va se tenir en lisière de forêt et dans les marais, marécages et tourbières. (COSEPAC, 2006; Environnement Canada, 2014)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un quiscale rouilleux?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?
Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2006. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le le Quiscale rouilleux (*Euphagus carolinus*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vi + 30 p.

ENVIRONNEMENT CANADA. 2014. Plan de gestion du Quiscale rouilleux (*Euphagus carolinus*) au Canada [Proposition], Série de plans de gestion de la Loi sur les espèces en péril, Environnement Canada, Ottawa, iv + 25 p.

RÂLE JAUNE | *Coturnicops noveboracensis*

LEP : préoccupante

COSEPAC : préoccupante (2009)

LEMV : menacée

IDENTIFICATION

Petit oiseau brun-jaunâtre, carrelé de brun/noir. Se tient immobile lorsqu'on l'approche. À l'envol, on remarque une tache blanche au bas de chaque aile, près du corps. Le nid se compose de 7 à 10 œufs.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Rôle de Virginie : Ce rôle est plus gros (23 cm) et a un long bec effilé. Le rôle jaune a un petit bec court. **Marouette de Caroline** : La marouette est plus grosse (plus de 20 cm versus 18 cm pour le rôle), n'a pas de tache à l'aile et le motif de son dos est différent.

RÉPARTITION

Dans la rive nord de l'estuaire, il a été observé dans les milieux humides au bord du fleuve et de la rivière Saguenay.

HABITAT

Vit dans le haut des marais d'herbes denses et dans les prairies maritimes. (COSEPAC, 2009; Environnement Canada, 2013; MFFP, 2010)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez un rôle jaune?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le Service Canadien de la Faune, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2009. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le rôle jaune (*Coturnicops noveboracensis*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vii + 36 p.

ENVIRONNEMENT CANADA. 2013. Plan de gestion du Rôle jaune (*Coturnicops noveboracensis*) au Canada, Série de Plans de gestion de la Loi sur les espèces en péril, Environnement Canada, Ottawa, iii + 26 p.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Espèces fauniques menacées ou vulnérables du Québec – Rôle jaune.

STERNE CASPIENNE | *Sterna caspia*

LEP : aucun

COSEPAQ : non en péril (1999)

LEMP : menacée

IDENTIFICATION

Son corps est blanc, gris pâle sur les ailes dont le bout est plus foncé. Se reconnaît par son gros bec rouge. L'adulte a une calotte noire en été et une calotte rayée noir et blanc en hiver.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Son bec rouge la distingue de la majorité des sternes. Son front ne devient jamais blanc.

RÉPARTITION

Sur la rive nord de l'estuaire, de rares observations ponctuelles ont été réalisées le long du Saint-Laurent.

HABITAT

Fréquente les littoraux sableux et les îles basses où elle niche souvent en colonie (avec d'autres sternes et goélands). (MFFP, 2010)

Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez une sterne caspienne?

QUOI FAIRE



- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous apercevez un nid ?

- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763

Vous entrez en collision/trappez/capturez un individu involontairement ?

Ou vous trouvez un oiseau mort ?

- Contactez le MFFP : 1 877 346-6763, aucune sanction n'est reliée.

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

STURNELLE DES PRÉS | *Sturnella magna*

LEP : aucun

COSEPAC : menacée (2011)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Elle a la poitrine jaune vif et le dos à motifs bruns, blancs et noirs. Les adultes ont une bande noire en forme de V sur la poitrine. Elle a une courte queue avec une tache blanche de chaque côté. Ces deux taches se voient bien à l'envol de l'oiseau. Son bec est plutôt long.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Sturnelle de l'Ouest : Ces deux espèces sont très similaires, mais le jaune de la poitrine de la sturnelle de l'Ouest se rend jusqu'à ses joues alors que ce n'est pas le cas chez la sturnelle des prés. Le dessus de la tête de la sturnelle de l'Ouest est également plus pâle. Cette espèce est rare sur la rive nord de l'estuaire, elle a été observée quelques fois aux Bergeronnes.

RÉPARTITION

Cette espèce n'est pas fréquente sur la rive nord de l'estuaire. Quelques observations ponctuelles confirment sa présence ici et là.

HABITAT

Fréquente principalement les prés, les prairies et les endroits ouverts où il y a présence d'herbes hautes. (COSEPAC, 2011)

QUOI FAIRE



Respecter le code de conduite pour l'observation des oiseaux disponible au début de ce guide. Vous apercevez une sturnelle des prés?

- Prenez en note la date et le lieu de la manière la plus précise possible
- Prenez une photo si possible
- Rapportez votre observation au portail eBird Québec

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

AIGLE ROYAL



(c) MFFP

ARLEQUIN PLONGEUR



(c) Biodôme

BRUANT DE NELSON



(c) Parc Bas St-Laurent

ENGOULEVENT BOIS-POURRI



(c) Nature Canada

ENGOULEVENT D'AMÉRIQUE



(c) SÉPAQ

FAUCON PÈLERIN



(c) Registre LEP

GARROT D'ISLANDE




(c) Biodôme

GONGLU DES PRÉS



(c) Carl Savignac - Registre LEP

GRÈBE ESCLAVON



(c) Site Web COSEPAC

GRIVE DE BICKNELL



(c) Serge Beaudet

GRIVE DES BOIS



(c) Registre LEP

HIBOU DES MARAIS



(c) Registre LEP

HIRONDELLE DE RIVAGE



(c) Ken Billington (a) Creative Commons

HIRONDELLE RUSTIQUE



(c) Glen Tepke

MARTINET RAMONEUR



(c) Wikipedia

MOUCHEROLLE À CÔTÉS OLIVE



(c) Dan Busby - Registre LEP

PARULINE DU CANADA



(c) Dominic Francoeur

PIOUI DE L'EST



(c) John Reaume

PLUVIER SIFFLEUR



(c) Sydney Maddock - RNCAN

PYGARGUE À TÊTE BLANCHE



(c) Comité ZIP RNE

QUISCALE ROUILLEUX



(c) Seabrook Leckie - Registre LEP

RÂLE JAUNE



(c) Dominic Sherony

STERNE CASPIENNE



(c) Environnement Canada

STURNELLE DES PRÉS



(c) Raymond Belhumeur - Registre LEP



.....

INSECTES

.....





.....

INSECTES

.....



COCCINELLE À DEUX POINTS | *Adalia bipunctata*

LEP : aucun

COSEPAC : aucun

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Cette coccinelle de forme compacte et arrondie peut présenter différents patrons de coloration. Le plus courant est rouge-orangé avec deux points noirs. Elle peut également être d'un noir uni avec un patron de taches orangées ou encore d'un rouge uni avec un patron de taches noires.

RÉPARTITION

Sur la rive nord de l'estuaire, elle se situe au nord de son aire de répartition. Cependant, on la retrouve tout le long de l'estuaire maritime jusqu'à la limite du golfe du Saint-Laurent.

HABITAT

Bien qu'elle se nourrit d'une grande variété de proies et qu'on peut la retrouver dans différents milieux, elle utilise principalement les milieux boisés et arbustifs au Québec. Sa présence est reliée à la présence de pucerons, dont elle s'alimente. (Skinner et Domaine, 2010; Skinner, Desrosiers et Domaine, 2012)

QUOI FAIRE



Au Québec, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) **ne protège pas** les insectes inscrits à la liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Seuls les insectes qui sont désignés menacés ou vulnérables sont protégés par la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV).

Éviter l'utilisation des pesticides dans vos jardins! Consultez la partie « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide.

DOMAINE, É., DESROSIERS, N. et B. SKINNER. 2010. Les insectes susceptibles d'être désignés menacés ou vulnérables au Québec. La Société Provancher d'Histoire Naturelle du Canada. Le Naturaliste Canadien, 134 : 2, pages 16-26.

SKINNER, B., DESROSIERS, N. et É DOMAINE. 2012. État des connaissances sur 30 espèces d'insectes susceptibles d'être désignés menacés ou vulnérables. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Faune Québec, 128 pages.

SKINNER, B. et É. DOMAINE. 2010. Rapport sur la situation de la coccinelle à deux points (*Adalia bipunctata*) au Québec. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Faune Québec. 48 pages.

FAUX-LONGICORNE SCALAIRE | *Cephaloon unguolare*

LEP : aucun

COSEPAC : aucun

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit insecte de l'ordre des coléoptères pouvant mesurer de 10 à 13 mm de long. Il est de couleur foncée sur le dessus du corps (brun foncé ou noir) et a les pattes plus pâles (brun pâle), parfois avec des taches noires. Ses antennes et ses pièces buccales sont également plus pâles. L'identification précise de l'espèce nécessite l'analyse des spécimens par un spécialiste.

RÉPARTITION

L'aire de répartition de cet insecte au Québec est très large allant de l'Abitibi jusqu'à la Basse-Côte-Nord. Bien qu'il soit rare, il est possible de l'observer occasionnellement dans les milieux forestiers le long de la rive nord de l'estuaire.

HABITAT

Se tient dans les forêts de conifères, particulièrement les sapinières. Aime la matière végétale en décomposition et les débris d'arbres où il va pondre ses œufs. (Domaine et al., 2010; Majka, 2011; Skinner et al., 2012)

QUOI FAIRE



Au Québec, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) **ne protège pas** les insectes inscrits à la liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Seuls les insectes qui sont désignés menacés ou vulnérables sont protégés par la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV).

Éviter l'utilisation des pesticides dans vos jardins! Consultez la partie « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide.

DOMAINE, É., DESROSIERS, N. et B. SKINNER. 2010. Les insectes susceptibles d'être désignés menacés ou vulnérables au Québec. La Société Provancher d'Histoire Naturelle du Canada. Le Naturaliste Canadien, 134 : 2, pages 16-26.

MAJKA, C. G. 2011. The Stenotrachelidae (Coleoptera) of Atlantic Canada. Journal of the Acadian Entomological Society, 7, pages 7-13.

SKINNER, B., DESROSIERS, N. et É DOMAINE. 2012. État des connaissances sur 30 espèces d'insectes susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Faune Québec. 128 pages.

MONARQUE | Danaus plexippus

LEP : préoccupante

COSEPAC : préoccupante (2010)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Papillon noir et orange vif. Il a aussi des taches blanches au bout des ailes. Les ailes ouvertes, ce papillon diurne mesure entre 9 et 10 cm. Sa chrysalide est vert pâle et or. Au stade larvaire, la chenille est rayée jaune vif, blanc et noir.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Vice-roy : Papillon plus petit (7 à 7,5 cm) ressemblant au monarque mais avec une ligne noire traversant chaque aile postérieure.

RÉPARTITION

Cette espèce est très rare sur la Côte-Nord, mais aurait été observée à quelques reprises. Elle pourrait être observée de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. Comme c'est une espèce migratrice, on ne la retrouve au Québec que du printemps à l'automne.

HABITAT

Le monarque se retrouve dans les champs en friche, les bords de route et les milieux ouverts. Une plante, l'asclépiade, est très importante pour les monarques qui s'en alimentent et l'utilisent pour pondre leurs œufs. (COSEPAC, 2010; Environnement Canada, 2014; WWF, 2015)

QUOI FAIRE



Au Québec, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) **ne protège pas** les insectes inscrits à la liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Seuls les insectes qui sont désignés menacés ou vulnérables sont protégés par la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV).

Voys voulez en faire plus?

- Éviter l'utilisation des pesticides et herbicides
- Créer des milieux propices pour eux en plantant de l'asclépiade, mais aussi des verges d'or, des marguerites jaunes et des asters qui sont des plantes productrices de nectar. (Espace pour la vie, 2015)

COSEPAC. 2010. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le monarque (Danaus plexippus) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. vii + 51 p.

ENVIRONNEMENT CANADA. 2014. Plan de gestion du monarque (Danaus plexippus) au Canada [Proposition]. Série de Plans de gestion de la Loi sur les espèces en péril. Environnement Canada, Ottawa, v + 43 p.

Espace pour la vie. 2015. Oasis pour les monarques.

WWF. 2015. Le Monarque.

SPONDYLE TÉNÉBRION

| Neospondylis upiformis

LEP : aucun

COSEPAC : aucun

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit insecte de l'ordre des coléoptères. Il mesure généralement de 10 à 17 mm de longueur. Il a une apparence coriace. Son corps est d'un noir lustré avec des reliefs.

RÉPARTITION

Rare et dispersé, cet insecte se retrouve surtout au sud du Québec. Cependant, la plus grande concentration de l'est de l'Amérique du Nord a été observée à l'île d'Anticosti. Il est donc probable qu'il puisse se retrouver sur la rive nord de l'estuaire (de Sacré-Cœur à Baie-Trinité).

HABITAT

Typique des forêts de conifères. La larve du spondyle ténébrion se retrouve à l'intérieur des racines d'arbres. Elle se nourrit en y creusant des galeries. (BugGuide, 2015; Domaine et al., 2010; Skinner et al., 2012)

QUOI FAIRE



Au Québec, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) **ne protège pas** les insectes inscrits à la liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Seuls les insectes qui sont désignés menacés ou vulnérables sont protégés par la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV).

Vous voulez en faire plus pour la protection des insectes? Consultez la section « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide.

BUGGUIDE. 2015. Neospondylis upiformis.

DOMAINE, É., DESROSIERS, N. et B. SKINNER. 2010. Les insectes susceptibles d'être désignés menacés ou vulnérables au Québec. La Société Provancher d'Histoire Naturelle du Canada. Le Naturaliste Canadien, 134 : 2, pages 16-26.

SKINNER, B., DESROSIERS, N. et É DOMAINE. 2012. État des connaissances sur 30 espèces d'insectes susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Faune Québec. 128 pages.

TRÉCHINE À SCAPES LARGES | *Trechus crassiscapus*

LEP : aucun

COSEPAQ : aucun

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit insecte faisant partie de l'ordre des coléoptères. Il peut mesurer de 4 à 5 mm de longueur. Il a le corps de couleur foncée, brun foncé ou noire, et une forme arrondie.

RÉPARTITION

Sa répartition au Québec est très vaste. L'espèce peut être présente sur la rive nord de l'estuaire dans les forêts boréales âgées et non perturbées. Il est donc probable de la rencontrer entre Sacré-Cœur et Baie-Trinité.

HABITAT

Cette espèce occupe plusieurs types d'habitats mais il démontre une préférence pour les milieux humides d'eau douce (étangs, marais, rives des lacs, etc.) où il y a présence de sphagnum et de carex. Il peut également fréquenter les forêts anciennes. (Bold Systems, 2015; Domaine et al., 2010; Skinner et al., 2012)

QUOI FAIRE



Au Québec, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1) **ne protège pas** les insectes inscrits à la liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables. Seuls les insectes qui sont désignés menacés ou vulnérables sont protégés par la Loi sur les espèces menacées et vulnérables (LEMV).

Vous voulez en faire plus pour la protection des insectes? Consultez la section « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide.

BOLDSYSTEMS. 2015. *Trechus crassiscapus*.

DOMAINE, É., DESROSIERS, N. et B. SKINNER. 2010. Les insectes susceptibles d'être désignés menacés ou vulnérables au Québec. La Société Provancher d'Histoire Naturelle du Canada. Le Naturaliste Canadien, 134 : 2, pages 16-26.

SKINNER, B., DESROSIERS, N. et É DOMAINE. 2012. État des connaissances sur 30 espèces d'insectes susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Faune Québec. 128 pages.

**TRÉCHINE
À SCAPES LARGES**



(c) Henri Goulet

**FAUX-LONGICORNE
SCALAIRE**



(c) Yves Dubuc
insectesduquebec.qc.ca

**SPONDYLE
TÉNÉBRION**



(c) Yves Dubuc
insectesduquebec.qc.ca

MONARQUE



(c) Yves Dubuc - insectesduquebec.qc.ca

COCCINELLE À 2 POINTS



(c) Yves Dubuc - insectesduquebec.qc.ca



.....

POISSONS

.....





.....

POISSONS

.....



ALOSE SAVOUREUSE | *Alosa sapidissima*

LEP : aucun

COSEPAC : aucun

LEMV : vulnérable

IDENTIFICATION

Poisson d'une longueur moyenne de 38 cm et de couleur argentée. Il a un corps allongé et aplati et on peut le reconnaître à sa grande tache noire derrière l'opercule, un peu plus haute que les yeux. D'autres taches plus pâles et plus petites sont présentes derrière la première à la même hauteur que cette dernière. Il a la queue très fourchue.

HABITAT

Il vit la majorité de sa vie en eau salée, dans les baies et les eaux côtières, mais se déplace en eau douce pour se reproduire.

RÉPARTITION

On la retrouve au large, dans le fleuve Saint-Laurent. Elle est présente tout le long de l'estuaire maritime. (MFFP, 2010; MFFP, 2015)

QUOI FAIRE



Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson à l'Observatoire Global du Saint-Laurent :

- * Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.).
- * Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible.
- * Rapportez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2010. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables au Québec – Alose savoureuse.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2015. Gros plans sur la faune – Alose savoureuse.

ANGUILLE D'AMÉRIQUE | *Anguilla rostrata*

LEP : aucun

COSEPAC : menacée (2012)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable (G4, S3)

IDENTIFICATION

Poisson excessivement allongé et rond pouvant atteindre 1,5 m et peser 7 kg. Les plus jeunes individus non matures sont pâles, d'une couleur allant d'un jaune verdoyant au brun, plus foncés sur le dos que sur les flans. Les individus matures sont bronzés, presque noirs avec le ventre pâle. Les nageoires dorsale, anale et caudale sont fusionnées et continues.

HABITAT

Elle vit en eau douce ou saumâtre, dans n'importe quel type de lacs et de rivières. Elle migre en eau salée pour se reproduire. Au cours de sa croissance, l'anguille utilise de multiples habitats aquatiques; elle vit dans les fonds vaseux, sableux et rocheux, utilise la végétation aquatique et se tient à différentes profondeurs.

DISTRIBUTION

L'anguille d'Amérique couvre une bonne partie des eaux continentales de l'ouest de l'Atlantique. Sur la rive nord de l'estuaire, on la retrouve dans les cours d'eau tout le long du territoire, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. (COSEPAC, 2012; Pêches et Océans Canada, 2015)

QUOI FAIRE



Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson à l'Observatoire Global du Saint-Laurent :

- * Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.).
- * Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible.
- * Rapportez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent.

COSEPAC. 2012. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur l'anguille d'Amérique (*Anguilla rostrata*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xiii + 127 p.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. 2015. Espèces aquatiques en péril – Anguille d'Amérique.

BAR RAYÉ | *Morone saxatilis* (POPULATION DU FLEUVE SAINT-LAURENT)

LEP : à l'étude

COSEPAC : en voie de disparition (2012)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Ce poisson a le corps allongé et mince. Son dos est vert olive foncé et le reste de son corps est argenté avec 7 à 8 lignes noires horizontales sur les flans. Il a deux nageoires dorsales séparées et la première comporte des épines. Dans le Saint-Laurent, il peut atteindre une longueur de 90 cm.

HABITAT

Le bar rayé est un poisson anadrome : il naît en eau douce puis passe la majorité de sa vie en eau salée. Il migre vers l'eau douce pour se reproduire.

RÉPARTITION

La population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent est répartie de Montréal jusqu'à Rimouski. Il est cependant possible d'en retrouver tout le long de la rive nord de l'estuaire, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. (COSEPAC, 2012; Pêches et Océans Canada, 2015; Plan d'action Saint-Laurent, 2008; Portail Québec, 2015)

QUOI FAIRE



Le bar rayé avait pratiquement disparu du fleuve Saint-Laurent à cause de la pêche commerciale et récréative, mais le gouvernement du Québec, avec le soutien de Pêches et Océans Canada, réintroduit des bars rayés provenant d'une autre population dans l'objectif de rétablir celle du Saint-Laurent.

La pêche du bar rayé dans l'estuaire du Saint-Laurent est interdite jusqu'à Gaspé.

En cas de capture accidentelle, **la remise à l'eau dans les meilleures conditions possibles est obligatoire.**

COSEPAC. 2012. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le bar rayé (*Morone saxatilis*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xx + 86 p.

REGISTRE DES ESPÈCES EN PÉRIL. Programme de rétablissement du bar rayé du fleuve Saint-Laurent. 2011. PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Espèces en péril – Bar rayé [population du fleuve Saint-Laurent].

PLAN D'ACTION SAINT-LAURENT. 2008. État du Saint-Laurent, La réintroduction du bar rayé dans le Saint-Laurent.

PORTAIL QUÉBEC. 2015. Pêche au bar rayé en 2015 – Nouvelles modalités de pêche au sud de la Gaspésie.

ESTURGEON NOIR | *Acipenser oxyrinchus*

(POPULATIONS DU SAINT-LAURENT)

LEP : à l'étude

COSEPAC : menacée (2011)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Grand poisson à nez allongé pouvant avoir une longueur maximale de 3 m. Son nez peut être recourbé chez les juvéniles. Il a le dos d'une couleur allant du bleu-noir au gris foncé et le ventre blanchâtre.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Esturgeon jaune : Les nageoires de l'esturgeon noir sont bordées d'une fine ligne blanche ce qui n'est pas le cas de l'esturgeon jaune.

HABITAT

Il vit en eau saumâtre et en eau salée, mais migre vers l'eau douce pour se reproduire. Il utilise les chenaux profonds pour se déplacer. Il existe des aires où l'espèce se concentre, pour l'élevage et l'alimentation des juvéniles, et potentiellement pour la reproduction, le repos et l'alimentation des adultes. L'esturgeon noir se nourrit principalement d'invertébrés benthiques, bien que les juvéniles de grande taille et les adultes s'alimentent aussi de petits poissons.

RÉPARTITION

On le retrouve tout le long de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Sa distribution va de la hauteur de Trois-Rivières jusqu'au golfe du Saint-Laurent. (Bernatchez et Giroux, 2000; COSEPAC, 2011; Pêches et Océans Canada, 2013; Pêches et Océans Canada, 2015)

BERNATCHEZ, L., M. GIROUX. 2012. Les poissons d'eau douce du Québec et leur répartition dans l'est du Canada. Broquet inc. 350 pages.

COSEPAC. 2011. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur l'esturgeon noir (*Acipenser oxyrinchus*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xiii + 56 p.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. 2013. Évaluation du potentiel de rétablissement de la population d'esturgeon noir du saint-Laurent.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Espèces aquatiques en péril – Esturgeon noir (populations du Saint-Laurent).

GRAND REQUIN BLANC

(POPULATION DE L'ATLANTIQUE)

Carcharodon carcharias

LEP : en voie de disparition

COSEPAC : en voie de disparition (2006)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Requin de grande taille, au corps fusiforme et au museau conique, d'une longueur jusqu'à 6 mètres. Le dessus de son corps varie du gris au noir et le dessous de son corps est blanc. La démarcation entre les 2 couleurs est bien visible. Il a de petits yeux noirs et des dents triangulaires en dents de scie.

HABITAT

Il vit dans les eaux salées autant près des côtes qu'au large et peut fréquenter différentes profondeurs, jusqu'à 1280 m.

RÉPARTITION

Le requin blanc vit dans les eaux de l'Atlantique et du Pacifique. Dans l'estuaire maritime, des observations ont été faites dans le chenal laurentien jusqu'à la hauteur de la rivière Portneuf. Il n'a pas été retrouvé plus à l'ouest. (COSEPAC, 2006; Pêches et Océans Canada, 2011)

QUOI FAIRE



Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

Au Canada, la principale menace du grand requin blanc est la prise accidentelle dans la pêche commerciale.

Vous voulez participer à améliorer la qualité de l'écosystème du Saint-Laurent? Lisez la partie « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide. (

COSEPAC. 2006. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) populations de l'Atlantique et du Pacifique au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. viii + 33 p.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Espèces aquatiques en péril – Grand requin blanc.

WWF Canada. 2015. Protégeons les populations de requin au Canada.

LOUP À TÊTE LARGE | Anarhichas denticulatus

LEP : menacée

COSEPAC : menacée (2012)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Gros poisson marin mou et gélatineux qui a une grosse tête et de petits yeux. Il peut être gris ou encore brun foncé avec un effet lustré de couleur mauve. Sa couleur est plus uniforme que celle des espèces lui ressemblant. Il va souvent avoir des motifs indistincts sur le corps. Il a également des dents ressemblant à des canines en avant de sa mâchoire. Il a une longue nageoire dorsale, mais n'a pas de nageoire pelvienne.

HABITAT

Se tient dans les colonnes d'eau et au fond des océans jusqu'à des profondeurs de 1000 m. Il préfère les fonds boueux et rocheux.

RÉPARTITION

On le retrouve en profondeur principalement au large de Terre-Neuve, mais il a été observé dans l'estuaire maritime, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. (COSEPAC, 2012; Pêches et Océans Canada, 2010; Registre Public des Espèces en Péril, 2015)

QUOI FAIRE



La pêche accidentelle est la principale menace du loup à tête large. **La remise à l'eau est obligatoire pour cette espèce.** Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

La qualité de l'environnement fluvial, particulièrement des fonds marins, et les changements climatiques sont aussi des facteurs importants pour la survie du loup. (Registre Public des Espèces en Péril, 2015)

Vous voulez participer à l'amélioration de l'écosystème du Saint-Laurent? Consultez la section « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2012. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le loup à tête large (Anarhichas denticulatus) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xi + 44 p. (Comité sur la situation des espèces en péril au Canada)

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. 2010. Espèces aquatiques – Détails pour loup à tête large.

REGISTRE PUBLIC DES ESPÈCES EN PÉRIL. 2015. Profil d'espèce – Loup à tête large.

LOUP ATLANTIQUE | Anarhichas lupus

LEP : préoccupante

COSEPAC : préoccupante (2012)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Gros poisson marin pouvant mesurer jusqu'à 1 m 50. Il a une grosse tête, une forme plutôt arrondie et de grandes dents ressemblant à des canines. Sa couleur varie du brun-vert au brun-violet et va jusqu'au bleu-gris. Il a également de 9 à 11 bandes noires qui traversent son corps de haut en bas. Il a une longue nageoire dorsale, mais n'a pas de nageoire pelvienne.

HABITAT

On trouve habituellement le loup atlantique sur les fonds rocheux et sablonneux, à une profondeur variant entre 50 et 150 m.

RÉPARTITION

Vit dans le nord de l'Atlantique et se rend jusqu'à l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Il est donc possible de le retrouver au large, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. (COSEPAC, 2012; Registre Public des Espèces en Péril, 2015)

Les prises accidentelles dans la pêche commerciale sont la principale menace au loup Atlantique. La qualité de l'environnement fluvial, particulièrement des fonds marins, et les changements climatiques sont aussi des facteurs importants pour la survie du loup.

QUOI FAIRE



Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

(Registre Public des Espèces en Péril, 2015)

Vous voulez participer à l'amélioration de l'écosystème du Saint-Laurent? Consultez la section « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide!

PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT DU LOUP À TÊTE LARGE (*Anarhichas denticulatus*) ET DU LOUP TACHETÉ (*Anarhichas minor*) ET PLAN DE GESTION DU LOUP ATLANTIQUE (*Anarhichas lupus*) AU CANADA (2008)

COSEPAC. 2012. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le loup atlantique (*Anarhichas lupus*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xi + 60 p.].

REGISTRE PUBLIC DES ESPÈCES EN PÉRIL. 2015. Profil d'espèce – Loup Atlantique.

LOUP TACHETÉ

| Anarhichas minor

LEP : menacée

COSEPAC : menacée (2012)

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Gros poisson allongé ayant une grosse tête arrondie. Il a une longue nageoire dorsale, mais n'a pas de nageoire pelvienne. Il peut être de couleur jaune foncé à brun foncé. Son corps est parsemé de taches foncées.

HABITAT

Le loup tacheté vit en eau salée; on le retrouve à des profondeurs de 200 m à 750 m.

RÉPARTITION

Il se trouve dans l'océan Arctique et l'Atlantique Nord, mais on le retrouve jusque dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Il est donc possible de le retrouver au large de Sacré-Cœur jusqu'à Baie-Trinité. (COSEPAC, 2012; Pêches et Océans Canada, 2009)

Les prises accidentelles dans la pêche commerciale sont la principale menace au loup tacheté. La dégradation de la qualité de l'habitat, particulièrement des fonds marins, et les changements climatiques sont des menaces au rétablissement du loup tacheté.

QUOI FAIRE



Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

(Registre Public des Espèces en Péril, 2015)

Vous voulez participer à l'amélioration de l'écosystème du Saint-Laurent? Consultez la section « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide!

PROGRAMME DE RÉTABLISSEMENT DU LOUP À TÊTE LARGE (*Anarhichas denticulatus*) ET DU LOUP TACHETÉ (*Anarhichas minor*) ET PLAN DE GESTION DU LOUP ATLANTIQUE (*Anarhichas lupus*) AU CANADA (2008)

COSEPAC. 2012. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le loup tacheté (*Anarhichas minor*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xi + 48 p. [Comité sur la situation des espèces en péril au Canada].

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Espèces aquatiques en péril – loup tacheté.

MARAÎCHE | *Lamna nasus*

LEP : aucun

COSEPAC : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

LEMV : en voie de disparition (2014)

IDENTIFICATION

Aussi appelée requin-taube commun, la maraîche est un grand requin pouvant atteindre 3 m 50. Elle est gris-bleu foncé sur le dos et blanche sur le ventre. L'arrière de sa nageoire dorsale comporte une partie blanche.

HABITAT

On la trouve autant en eaux côtières qu'en hautes eaux, principalement à des profondeurs d'au moins 200 m, mais elle peut plonger à plus de 1000 m.

RÉPARTITION

Elle a une très large répartition dans les océans de la planète. Il est possible de la retrouver dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. (COSEPAC, 2014; Registre Public des Espèces en Péril, 2015)

La pêche de la maraîche est interdite depuis 2013. La surpêche a été responsable de l'effondrement de la population. La maraîche est également une prise accidentelle lors d'autres types de pêche commerciale. (COSEPAC, 2014)

QUOI FAIRE



Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

Vous voulez participer à l'amélioration de l'écosystème du Saint-Laurent? Consultez la section « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2014. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la maraîche (*Lamna nasus*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xi + 42 p. (Registre public des espèces en péril).

REGISTRE PUBLIC DES ESPÈCES EN PÉRIL. 2015. Profil d'espèce – Maraîche.

MERLUCHE BLANCHE | Urophycis tenuis

(POPULATION DU SUD DU GOLFE DU SAINT-LAURENT)

LEP : aucun

COSEPAC : menacée (2013)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Poisson de forme allongée, pouvant mesurer jusqu'à 1 m 35. Il est plus mince que la morue, à qui il peut ressembler. Il a 2 nageoires dorsales, une petite pointue et une longue qui couvre plus de la moitié du dos. Malgré son nom, la merluche blanche n'est pas blanche du tout. Bien que sa couleur varie, cette espèce a habituellement un dos brun ou pourpre, des côtés bronze ou un ventre blanc ou blanc-jaunâtre parsemé de petits points noirs. Elle a une large bouche qui va jusqu'en dessous des yeux et un barbillon au menton.

HABITAT

La merluche blanche est un poisson de fond. Elle préfère les fonds mous et boueux. On la retrouve à des profondeurs très variées jusqu'à 1000 m.

RÉPARTITION

On retrouve cette espèce dans l'ouest de l'Atlantique Nord. Dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent, on la retrouve tout le long du territoire, au large de Tadoussac jusqu'à Baie-Trinité. [COSEPAC, 2013; Pêches et Océans Canada, 2015]

QUOI FAIRE



Un moratoire de pêche protège la merluche blanche du sud du golfe du Saint-Laurent depuis 1995. La survie de cette espèce dépend également des conditions de l'environnement fluvial. [COSEPAC, 2013]
Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

Vous voulez participer à améliorer la qualité de l'écosystème du Saint-Laurent? Lisez la partie « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide.

COSEPAC. 2013. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la Merluche blanche (Urophycis tenuis) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xiii + 49 p.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA, Espèces aquatiques en péril – merluche blanche, population du sud du golfe du Saint-Laurent

MORUE FRANCHE

| Gadus morhua

LEP : à l'étude

COSEPAC : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

LEMV : en voie de disparition (2010)

IDENTIFICATION

Poisson de fond brun-vert avec des taches noires sur le dos et une ligne pâle distincte qui le traverse dans le sens de la longueur. Il a un barbillon au menton. Il peut mesurer jusqu'à 55 cm de long. Il a 3 nageoires dorsales et 2 anales

HABITAT

Poisson d'eau salée, au stade juvénile, la morue fréquente les milieux plus protégés comme les herbiers maritimes. Au stade adulte, la morue fréquente une grande diversité d'habitats.

RÉPARTITION

Il existe plusieurs populations différentes de morue. La population sud-laurentienne englobe les individus de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. On retrouve la morue au large, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. (COSEPAC, 2010; Pêches et Océans Canada, 2013)

QUOI FAIRE



La principale cause du déclin de la morue a été la surpêche. Cette espèce est aussi affectée par les conditions environnementales changeantes du Saint-Laurent. (COSEPAC, 2010)

Vous voulez participer à l'amélioration de l'écosystème du Saint-Laurent? Consultez la section « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide!

COSEPAC. 2010. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la morue franche (Gadus morhua) au Canada – Mise à jour. Comité sur la Situation des Espèces en Péril au Canada.. Ottawa. zii + 87 p.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Espèces aquatiques en péril – Morue franche du Sud laurentien.

OMBLE CHEVALIER OQUASSA | *Salvelinus alpinus oquassa*

LEP : aucun

COSEPAC : aucun

LEMV : susceptible de devenir menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Poisson d'eau douce le plus nordique, il appartient à la famille des saumons. Il a le dos foncé, bleu ou vert, avec des points plus pâles, ce trait permet de bien le différencier. Il a les flans rouges. Son ventre est pâle ou rouge. Sa nageoire caudale est fourchue. Les nageoires pectorales et pelviennes sont bordées d'une ligne blanche.

HABITAT

L'omble chevalier oquassa vit dans les eaux profondes et froides des lacs du Québec. Celui-ci, contrairement à l'omble chevalier erythrinus, ne migre pas vers l'eau salée, il ne vit qu'en eau douce.

RÉPARTITION

Deux sous-espèces d'omble chevalier existent au Québec, mais sur la rive nord de l'estuaire du Saint-Laurent, c'est la sous-espèce oquassa qui est présente. Elle est présente sur tout le territoire, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. (MFFP, 2013; MFFP, 2003)

Les populations d'omble chevalier oquassa de la Côte-nord ne seraient pas dans un état critique, mais il est important d'en assurer leur suivi puisqu'elles sont à risque plus au sud du Québec.

QUOI FAIRE



Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au MFFP

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible.
- Rapportez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent

Vous voulez participer à l'amélioration de l'écosystème du Saint-Laurent? Consultez la section « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide!

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2013. Gros plans sur la faune – Omble chevalier.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2003. Liste des espèces fauniques menacées ou vulnérables du Québec – Omble chevalier oquassa.

RAIE À QUEUE DE VELOURS | Malacoraja senta

(POPULATION DU CHENAL LAURENTIEN ET DU PLATEAU NÉO-ÉCOSSAIS)

LEP : aucun | COSEPAC : préoccupante (2012) | LEMV : aucun

IDENTIFICATION

C'est une des plus petites raies de l'Atlantique Nord-Ouest. Elle a un corps plat, en forme de cœur et un museau pointu. Le dessus du corps est rugueux et épineux, bien qu'il puisse comporter certaines sections lisses chez l'adulte. Son dos est brun pâle avec des taches plus foncées et son ventre est blanc avec des taches foncées.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Sa queue est fine et est ornée de 1 à 4 bandes pâles transversales chez les juvéniles. Cette espèce se distingue facilement des autres espèces de raies de l'Atlantique Nord-Ouest par sa queue qui est l'une des plus longues par rapport à sa longueur totale (la longueur de la queue est égale à celle du corps), et les deux « triangles » de cartilage opaque fin sur son museau. Le patron d'épines permet de différencier l'espèce avec certitude.

HABITAT

Elle vit généralement à des profondeurs comprises entre 70 et 480 m et à des températures se situant entre 2,7 et 10 °C. On trouve les agrégations de raies à queue de velours les plus denses dans les chenaux entourant les bancs peu profonds où l'eau est plus chaude.

RÉPARTITION

La raie à queue de velours est indigène de l'Atlantique Nord-Ouest et la plus grande partie de son aire de répartition se situe au Canada. Dans le Saint-Laurent, on la retrouve dans le chenal Laurentien, grande vallée sous-marine dont la tête se situe à Tadoussac. On la retrouve donc tout le long de l'estuaire maritime. (COSEPAC, 2012; Pêches et Océans Canada, 2013)

QUOI FAIRE



La mortalité par les phoques et la prise accessoire lors de pêches commerciales pour d'autres espèces sont les principales menaces au rétablissement de la raie à queue de velours. Cette espèce est aussi affectée par les conditions environnementales du Saint-Laurent. (COSEPAC, 2012) Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

Vous voulez participer à améliorer la qualité de l'écosystème du Saint-Laurent? Lisez la partie « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide.

COSEPAC. 2012. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la raie à queue de velours (Malacoraja senta) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. xviii + 84 p.

MPO. 2013. Évaluation du potentiel de rétablissement de la raie à queue de velours (Malacoraja senta) de l'unité désignable de la fosse de l'île Funk. Secr. can. de consult. sci. du MPO, Avis sci. 2013/035.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. 2015. Profil d'espèce. Raie à queue de velours, population du chenal Laurentien et du plateau néo-écossais.

RAIE ÉPINEUSE | *Amblyraja radiata*

LEP : à l'étude

COSEPAC : préoccupante (2012)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Elle a le corps plat et peut atteindre 110 cm de longueur. Son dos est brun et possède une rangée de 11 à 19 grosses épines partant du centre pour se prolonger sur la queue. Son patron d'épines complexe permet de bien distinguer l'espèce. Son ventre est blanc et peut avoir des taches plus foncées.

HABITAT

Elle vit au fond des océans à diverses profondeurs (de 18 m à plus de 1400 m) et dans différents types de substrats.

RÉPARTITION

Elle peuple l'océan Atlantique. Dans le Saint-Laurent, on la retrouve tout le long de l'estuaire maritime. (COSEPAC, 2012; MPO, 2009)

La mortalité par les phoques et la prise accessoire lors de pêches pour d'autres espèces sont les principales menaces au rétablissement de la raie épineuse. Cette espèce est aussi affectée par les conditions environnementales changeantes du Saint-Laurent. (COSEPAC, 2012)

QUOI FAIRE



Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

Vous voulez participer à l'amélioration de l'écosystème du Saint-Laurent? Consultez la section « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide!

RAIE TACHETÉE | *Leucoraja ocellata*

(POPULATION DU GOLFE DU SAINT-LAURENT)

LEP : à l'étude

COSEPAC : en voie de disparition (2015)

LEMV : susceptible de devenir menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

La raie tachetée a un corps plat, un museau arrondi et un dos brun pâle ou foncé avec des taches circulaires foncées. Le dessous de son corps est blanc ou gris. Le milieu du dos et la queue ont 3 rangées d'épines ou plus commençant à l'épaule et arrêtant à la première nageoire dorsale.

HABITAT

Vit en eau salée sur les fonds sableux ou rocheux, habituellement à moins de 100 m de profondeur, mais il est possible de la retrouver jusqu'à des profondeurs de près de 400 m.

RÉPARTITION

Elle fréquente le golfe du Saint-Laurent et se rend jusque dans l'estuaire maritime. (COSEPAC, 2015; Pêches et Océans Canada, 2014; Scallon-Chouinard et al., 2007)

QUOI FAIRE



Aucune pêche dirigée de la raie tachetée n'est permise au Canada. Le déclin de la population dans les années 1970 et 1980 pourrait avoir été causé par les prises accessoires dans la pêche visant d'autres espèces de poisson de fond. L'espèce a un taux de croissance démographique lent, et la principale menace semble être un taux élevé de mortalité dû à des causes autres que la pêche, possiblement la prédation par le phoque gris. (COSEPAC, 2015)

Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

Vous voulez participer à améliorer la qualité de l'écosystème du Saint-Laurent? Lisez la partie « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide.

COSEPAC 2005. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur la raie tachetée (*Leucoraja ocellata*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. viii + 47 p.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. Raie tachetée.

SCALLON-CHOUINARD, P.M., DUTIL, J.D., et S. HURTUBISE. 2007. Liste des espèces de poissons inventoriés dans l'estuaire maritime du Saint-Laurent entre 1930 et 2005. Rapp. tech. can. sci. halieut. aquat. 2719 : vi + 58 p.

SAUMON ATLANTIQUE | *Salmo salar*

(POPULATION DE L'OUEST DE LA CÔTE-NORD DU QUÉBEC)

LEP : aucun

COSEPAC : préoccupante (2010)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Poisson pouvant atteindre plus de 100 cm de long. Il a le dos bleu-vert brunâtre et les flancs argentés avec des gros points noirs ou en forme de x sur fond pâle. Lors de la fraie, il prend des teintes rouges, vertes ou brunes. Il peut également avoir des points rouges.

HABITAT

Le Saumon atlantique est anadrome. Il est très fidèle à sa rivière d'origine et y retourne pour se reproduire. Il utilise des eaux claires au fond rocheux pour frayer.

DISTRIBUTION

La migration en eau salée entraîne tous les saumons atlantiques anadromes vers la mer du Labrador. Il revient dans le Golfe St-Laurent puis fréquente tout l'estuaire maritime du Saint-Laurent et migre vers les rivières de la rive nord à partir de juin en vue de la fraie d'automne. Certains individus retournent en mer l'automne et d'autres séjournent l'hiver en eau douce et y retournent au printemps. (MFFP, 2013; Pêches et Océans Canada, 2014)

QUOI FAIRE



Un permis spécifique au saumon est nécessaire pour le pêcher au Québec. Visitez le site internet de Saumon Québec pour plus d'informations. Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Le poisson doit être relâché sur le champ, mort ou vif à moins d'être détenteur d'un permis de pêche au saumon valide
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Rapportez votre observation à l'Observatoire Global du Saint-Laurent

Vous voulez participer à améliorer la qualité de l'écosystème du Saint-Laurent? Lisez la partie « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide.

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS. 2013. Gros plan sur la faune – Saumon atlantique.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. 2014. Espèces aquatiques en péril – Saumon atlantique (population de l'ouest de la Côte-Nord du Québec - UD8).

SÉBASTE ATLANTIQUE | *Sebastes mentella* (POPULATION DU GOLFE DU SAINT-LAURENT ET DU CHENAL LAURENTIEN)

SÉBASTE D'ACADIE | *Sebastes fasciatus* (POPULATION DE L'ATLANTIQUE)

LEP : aucun

COSEPAC : Sébaste atlantique – en voie de disparition (2010) | Sébaste d'Acadie – menacé (2010)

LEMV : aucun

IDENTIFICATION

Visuellement, il est très difficile de différencier le sébaste atlantique du sébaste d'Acadie. Les 2 espèces sont en péril et les mêmes précautions doivent être prises à leur égard. Ces poissons sont orangés ou rouges. Ils ont de gros yeux et une grosse mâchoire inférieure. Ils ont également des épines formant une couronne vers l'extérieur à la hauteur de l'opercule.

HABITAT

Poissons d'eau salée, ils vivent le long des talus continentaux et dans les chenaux profonds.

DISTRIBUTION

Présents des deux côtés de l'Atlantique, les sébastes sont présents dans l'estuaire maritime et remonte jusque dans le fjord du Saguenay. (COSEPAC, 2010; Pêches et Océans Canada, 2015)

La pêche est la principale menace de cette espèce. Cette espèce est aussi affectée par les conditions environnementales de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent.

QUOI FAIRE



Vous pouvez soumettre l'observation de ce poisson au Réseau de Suivi de la Biodiversité Aquatique :

- Prenez une photo si possible (individu mort, pêché accidentellement, etc.)
- Notez la date, l'heure, le lieu et les caractéristiques du milieu de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information via le site WEB.

Vous voulez participer à améliorer la qualité de l'écosystème du Saint-Laurent? Lisez la partie « Vous voulez en faire plus? » à la fin de ce guide.

COSEPAC. 2010. Évaluation et Rapport de situation du COSEPAC sur le complexe sébaste atlantique/sébaste d'Acadie (*Sebastes mentella* et *Sebastes fasciatus*) au Canada. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Ottawa. x + 84 p.

PÊCHES ET OCÉANS CANADA. 2015. Espèces aquatiques en péril – Sébaste atlantique (population du golfe du Saint-Laurent et du chenal Laurentien) et sébaste d'Acadie.

ALOSE ÉPINEUSE



(c) Biodôme

ANGUILLE D'AMÉRIQUE



(c) OGSL - G. Verreault

BAR RAYÉ



(c) Biodôme

ESTURGEON NOIR



(c) Biodôme

GRAND REQUIN BLANC



(c) DFO - MPO

LOUP ATLANTIQUE



(c) Biodôme

MARAÎCHE



(c) Registre LEP

MERLUCHE BLANCHE



(c) Claude Nonzeres

MORUE FRANCHE



(c) claudelafondphoto.com - Biodôme

OMBLE CHEVALIER OQUASSA



(c) Biodôme

RAIE À QUEUE DE VELOURS




(c) Registre LEP

RAIE ÉPINEUSE



(c) Biodôme

RAIE TACHETÉE




(c) Biodôme

SAUMON ATLANTIQUE



(c) Biodôme

SÉBASTE ATLANTIQUE



(c) R. Larocque



.....

VÉGÉTAUX

.....





.....

VÉGÉTAUX

.....



CAREX DES GLACES | *Carex glacialis*

LEP : aucun

LEMV : menacée (région 09 Côte-Nord seulement)

IDENTIFICATION

Petite plante à l'allure de « foin » d'une hauteur maximale de 20 cm. Elle pousse en petites touffes et produit de petits épis. Ses tiges sont brun-orangé à la base et sont de même hauteur ou dépassent légèrement les feuilles et portent chacune un seul épi.

RÉPARTITION

Sur notre territoire, il n'y a qu'une seule population connue, celle des dunes de Tadoussac, et c'est la plus au sud en Amérique du Nord. Elle se retrouve également à deux autres endroits sur la Côte-Nord (près de Havre Saint-Pierre et à la tête de la rivière Magpie) et pourrait potentiellement se retrouver dans d'autres secteurs le long de la rive nord de l'estuaire.

HABITAT

Vit dans les milieux ouverts et bien drainés, dans les endroits sablonneux (dunes) ou composés de gravier et sur les affleurements rocheux. (Dignard, 2006; MDDELCC, 2015)

QUOI FAIRE

Le piétinement est une menace pour cette espèce. Demeurez dans les sentiers lorsque vous êtes dans les endroits sablonneux, surtout si vous circulez en motorisé.



Vous avez observé cette espèce? Vous pouvez soumettre votre observation au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec.

- Prenez une photo si possible
- Notez la date, les coordonnées et les caractéristiques du site ainsi qu'une estimation du nombre de plants de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information en utilisant le formulaire disponible en ligne

CENTRE DE DONNÉES SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC. 2008. Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec. 3e édition. Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, Québec. 180 p.

DIGNARD, N., P. PETITCLERC, J. LABRECQUE et L. COUILLARD, 2009. Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables. Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 144 p.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 2015. Espèce menacée au Québec – *Carex des glaces*.

HUDSONIE TOMENTEUSE | *Hudsonia tomentosa*

LEP : aucun

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Petit arbuste très ramifié, atteignant 20 cm de hauteur. Il forme des touffes denses et arrondies. Produit de nombreuses fleurs jaunes à 5 pétales au bout des rameaux. Les feuilles ressemblent à de petites écailles et sont surtout concentrées dans la partie supérieure des rameaux. Les poils gris qui recouvrent les tiges et les feuilles donnent une apparence grisâtre à la plante.

RÉPARTITION

Est présente sur une partie de la rive nord de l'estuaire, soit de Pointe-aux-Outardes à Baie-Trinité.

HABITAT

Vit principalement dans les ouvertures de peuplements forestiers et les milieux ouverts bien drainés telles les dunes et les terrasses de sable en bordure du golfe. (Marie-Victorin, 2002)

QUOI FAIRE



Le piétinement et les activités qui provoquent la déstabilisation des dunes de sable est une menace pour cette espèce. Demeurez dans les sentiers lorsque vous êtes dans les endroits sablonneux comme les dunes et les plages, surtout si vous circulez en motorisé.

Vous avez observé cette espèce? Vous pouvez soumettre votre observation au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec.

- Prenez une photo si possible
- Notez la date, les coordonnées et les caractéristiques du site ainsi qu'une estimation du nombre de plants de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information en utilisant le formulaire disponible en ligne

Autres sources d'informations disponibles

MATTEUCCIE FOUGÈRE-À-L'AUTRUCHE | *Matteuccia struthiopteris*

LEP : aucun

LEMV : vulnérable à la récolte

IDENTIFICATION

Seule fougère comestible du Québec, cette plante peut être assez grande : jusqu'à 1,75 m de hauteur. Elle a deux types de feuilles : les feuilles stériles qui sont vertes et bien déployées et les feuilles fertiles qui sont brunâtres, plus petites, non déployées et rassemblées en couronne à la base des feuilles stériles. On reconnaît bien cette espèce par le sillon le long de son rachis (sa tige) et par l'absence de poils sur la plante (MDDELCC, 2005). Les crosses juvéniles (têtes de violon) sont vertes et recouvertes d'écailles dorées.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Osmonde cannelle et osmonde de Clayton :

Les osmondes n'ont pas de sillon sur leur rachis (tige), celui-ci est rond. L'osmonde cannelle est également recouverte d'un duvet couleur cannelle alors que la matteuccie n'a pas de poils.

RÉPARTITION

Moins courante sur la rive nord de l'estuaire qu'au sud du Québec, on la retrouve principalement au sud du territoire, dans les secteurs de Tadoussac et de Sacré-Cœur. La probabilité de la retrouver diminue en cheminant vers le nord.

HABITAT

Cette plante vit principalement à l'ombre, en milieu forestier, dans les plaines inondables ou dans les fossés. (APBB, s.d.; CC-BIO, 2015; MDDELCC, 2005)

QUOI FAIRE



La récolte de cette plante est réglementée : 5 plants peuvent être récoltés au maximum et un seul plant peut être mis à la vente. Il est fortement conseillé de ne pas cueillir plus de la moitié des crosses d'une plante pour ne pas nuire à sa survie.

Vous voulez en faire plus ? Lisez notre section du même nom à la fin de ce guide !

ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DE BOISÉS DE LA BEAUCE.s.d. Fougère-à-l'autruche – Matteucie.

CC-BIO. 2015. Effets des changements climatiques sur la biodiversité du Québec – Cartes et données.

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 2005. Matteucie fougère-à-l'autruche.

POTAMOT À GEMMES

Potamogeton pusillus subsp. gemmiparus

LEP : aucun

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Plante aquatique submergée, elle n'a pas de feuilles flottantes sur l'eau. Ses tiges mesurent habituellement 20 à 50 cm de long mais elles peuvent parfois atteindre 1 m de longueur. Ses feuilles sont minces, très étroites, longues de 1 à 6 cm, possèdent une seule nervure et sont attachées à la tige en alternance (et non face à face).

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Autres espèces de potamot : Le potamot à gemmes a des feuilles très étroites ne dépassant pas 0,7 cm de large et a un aspect linéaire et non buissonnant.

HABITAT

Vit en eau douce dans les secteurs calmes des rivières et des lacs.

RÉPARTITION

La seule population connue du territoire est localisée à proximité des Bergeronnes (Dignard et al., 2009)

QUOI FAIRE



Vous avez observé cette espèce? Vous pouvez soumettre votre observation au Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec.

- Prenez une photo si possible
- Notez la date, les coordonnées et les caractéristiques du site ainsi qu'une estimation du nombre de plants de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information en utilisant le formulaire disponible en ligne

Vous voulez en faire plus? Consultez la section du même nom à la fin de ce guide!

UTRICULAIRE À SCAPES GÉMINÉS | *Utricularia geminiscapa*

LEP : aucun

LEMV : susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable

IDENTIFICATION

Plante aquatique flottante ou submergée, à tiges pouvant mesurer jusqu'à 1 m de long. Les feuilles sont constituées de segments très fins et ramifiés plusieurs fois. La plante produit deux types de fleurs. Les unes, de couleur jaune, sont portées sur une longue hampe et dressées hors de l'eau, les autres sont submergées, portées par de courts pédoncules et fixées ne s'ouvrent pas.

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES

Autres Utriculaires : L'Utriculaire à scapes géminées est la seule espèce à posséder des fleurs submergées.

HABITAT

Dans les eaux calmes et stagnantes des mares de tourbières à sphaignes.

RÉPARTITION

Deux populations ont été localisées, soit celles des îlets Jérémie et près de la Rivière-aux-Outardes Elle pourrait par contre être présente ailleurs sur le territoire de la rive nord de l'estuaire, de Sacré-Cœur à Baie-Trinité. (Dignard et al., 2009)

QUOI FAIRE



Vous avez observé cette espèce? Vous pouvez soumettre votre observation au Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec.

- Prenez une photo si possible
- Notez la date, les coordonnées et les caractéristiques du site ainsi qu'une estimation du nombre de plants de la manière la plus précise possible
- Soumettez cette information en utilisant le formulaire disponible en ligne

CENTRE DE DONNÉES SUR LE PATRIMOINE NATUREL DU QUÉBEC. 2008. Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du Québec. 3e édition. Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs, Québec. 180 p.

DIGNARD, N., P. PETITCLERC, J. LABRECQUE et L. COUILLARD, 2009. Guide de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables. Côte-Nord et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, 144 p. (Le document peut être téléchargé à cette adresse : <http://www.mmf.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-activites-diversite.jsp>)

MARIE-VICTORIN, F., 2002. Flore laurentienne. 3e édition mise à jour par L. Brouillet, S.G. Hay et I. Goulet en collaboration avec M. Blondeau, J. Cayouette et J. Labrecque. Gaëtan Morin éditeur, membre de Chenelière Éducation, Montréal. 1 093 p.

CAREX DES GLACES



(c) N. Dignard - MFFP

HUDSONIE TOMATEUSE



(c) P. Petitclerc - MFFP

MATTEUCCIE FOUGÈRE-À-L'AUTRUCHE POTAMOT À GEMMES



(c) N. Dignard - MFFP



(c) Creative Commons Attribution

UTRICULAIRE À SCAPES GÉMINÉS



(c) N. Dignard - MFFP



.....

**VOUS VOULEZ
EN FAIRE PLUS ?**

.....





.....

**VOUS VOULEZ
EN FAIRE PLUS ?**

.....



VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS ?

Plusieurs actions peuvent être prises à la maison ou lors de la pratique de nos loisirs pour aider les espèces en péril! Dans la section suivante, vous trouverez certaines pistes qui vous permettront de faire partie de la solution!

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D'UN TERRAIN? RENDEZ-LE ACCUEILLANT POUR LA FAUNE!

Évitez l'utilisation des pesticides dans votre jardin ou sur votre gazon : Les produits Chimiques, contaminent les insectes, les bons comme les mauvais, ce qui nuit aux animaux qui s'en nourrissent comme les hirondelles ou encore les chauves-souris.

- **Faites des aménagements qui offrent abri, eau et nourriture à la faune :** Plantez des espèces caractéristiques de votre région, construisez des abris pour les oiseaux ou les chauves-souris ou encore valorisez les troncs d'arbres et les débris végétaux. Pour des idées, visitez les sites web suivants :
 - Fédération Canadienne de la Faune, onglet jardinage 101+
 - Chauve-souris aux abris
- **Conservez une bande riveraine si vous habitez à coté d'un cours d'eau :** En plus d'aider à améliorer la qualité de l'eau et à réduire les risques d'érosion, la bande riveraine est également un habitat de prédilection pour la faune aquatique!
- **Vous pouvez même faire certifier votre arrière-cour!** Pour en savoir plus, lisez sur le programme de certification Habitat arrière-cour de la Fédération Canadienne de la Faune sur leur site web.

VOUS ÊTES UN CHASSEUR? AMÉLIOREZ VOS PRATIQUES POUR AIDER LES ESPÈCES EN PÉRIL!

- **Apprenez à bien distinguer les canards** pour éviter de chasser des espèces fragiles.
- Saviez-vous que les résidus de plombs dans les carcasses et les viscères laissés en nature peuvent contaminer les espèces qui s'en nourrissent? C'est le cas de l'aigle royal et du pygargue à tête blanche! Pour éviter cette situation, **ne laissez rien derrière vous lorsque vous partez à la chasse!** Récupérez toutes vos carcasses et jetez les viscères une fois rendus chez vous.

VOUS ÊTES TRAPPEUR? PRENEZ DES MESURES POUR ÉVITER LES ESPÈCES EN PÉRIL!

- Consultez le document en annexe de ce guide : « Les aigles et le piégeage : comment éviter les captures accidentelles? »

VOUS VOULEZ EN FAIRE PLUS ?

PARTICIPEZ À LA PROTECTION DES HABITATS NATURELS!

- **Demeurez dans les sentiers lorsque vous visitez des milieux naturels.** Le piétinement, à pied ou en motorisé, affecte grandement les communautés végétales qui sont implantées. Évitez de leur nuire!
 - **Conservez les milieux humides!** Ces endroits font partie des milieux les plus productifs de la planète et ils sont essentiels à la survie de nombreuses espèces en péril comme le râle jaune, le grèbe esclavon ou encore le garrot d'Islande.
 - **N'ensemencez pas les lacs sans poisson** et faites attention pour éviter l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Pour en savoir plus, consultez le site Internet du Ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs, section espèces envahissantes.
-

PARTICIPEZ À LA PROTECTION DU FLEUVE SAINT-LAURENT!

- Vous vivez sur les rives du fleuve? **Conservez vos berges de la manière la plus naturelle possible!** La conservation de la végétation est essentielle pour réduire l'érosion côtière. De plus, plusieurs organismes utilisent les plages et littoraux pour faire leur nid et pondre leurs œufs. Si vos berges ont été altérées, n'hésitez pas à les revégétaliser! Pour en savoir plus, visitez les sites web des organismes suivants :
 - Bande Riveraine
 - Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec

Impliquez-vous dans les activités de protection! Participez aux nettoyages des berges, aux plantations dans les bandes riveraines, à la restauration des habitats pour la faune près de chez vous! Plusieurs organismes travaillent à améliorer la qualité des milieux riverains et sont souvent à la recherche de bénévoles.

Ces actions font partie d'une multitude d'activités permettant d'aider à préserver la nature et sa faune et flore. Trouvez celle qui vous convient et prenez part au changement!

QUI CONTACTER ?

MAMMIFÈRES MARINS

Vous voyez un **mammifère marin mort ou en difficulté**? Vous observez une **baleine noire** ou un **rorqual bleu accompagné d'un petit**? Contactez le Réseau Québécois d'Urgences pour les Mammifères Marins au **1-877-722-5346**.

En cas de collision ou de dérangement d'un mammifère marin dans le Parc Marin, contactez Parc Canada (24h/24) au 1-866-508-9888.

Vous observez une espèce en péril? Signalez-la à l'Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL) via la plateforme web.

.....

OISEAUX

Vous observez un nid d'une espèce menacée ou vulnérable? Un acte de braconnage? Vous chassez, capturez, trappez accidentellement ou trouvez un oiseau mort à statut précaire? Contactez le MFFP au **1-800-563-2191**.

Vous observez un oiseau en péril? Soumettez votre observation sur la plateforme du site web de ebird québec.

.....

PLANTES

Vous observez une espèce en péril? Signalez-la au Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec via le site web.

MAMMIFÈRES TERRESTRES

Vous êtes témoin de braconnage? Contactez SOS Braconnage au **1 800 463-2191**.

Vous observez une espèce en péril? Ou une chauve-souris morte ou volant en plein jour? Contactez le ministère au **1-877-346-6763**. Pour les espèces en péril, vous pouvez également la signaler au Centre de Données sur le Patrimoine Naturel du Québec via le site web.

Vous avez des visiteurs inopportuns dans votre maison? Consultez le site web du Ministère Faune Forêts et Parcs à la section faune inopportuns

Vous observez une colonie de chauve-souris? Remplissez le formulaire à la fin de ce guide et envoyez-le à l'adresse indiquée. Vous pouvez aussi soumettre cette information via le site web : chauve-souris.ca

.....

POISSONS

Vous observez un poisson parmi les suivants? Soumettez votre observation sur la plateforme de l'Observatoire Global du Saint-Laurent (OGSL) via la plateforme web.

Alose savoureuse
Anguille d'Amérique
Omble chevalier
Saumon Atlantique

Vous observez un autre poisson en péril? Soumettez votre observation sur la plateforme du site web réseau de suivi de la biodiversité aquatique.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

PÊCHE

Pour la pêche dans les lacs et rivières du Québec :

- Pour connaître les périodes de pêche et obtenir les cartes des zones de pêche, visitez le site du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ;
- Pour toute autre question, appelez au **1 877 346-6763**

Pour la pêche dans le fleuve Saint-Laurent :

- Visitez le site Internet de Pêches et Océans Canada ;
 - Pour toute autre question (Côte-Nord), appelez au **1-800-463-1729**
-

CHASSE & TRAPPE

Pour toute question concernant la faune et la réglementation : **1-877-346-6763**

.....

RANDONNÉE

Pour en savoir plus sur les parcs et les réseaux de sentiers de plein air de la rive nord de l'estuaire :

- Site web du Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
- Site web de Tourisme Côte-Nord.

CUEILLETTE DE MOLLUSQUES

Consultez les sites Internet de Pêches et Océans Canada et du Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques.

Pour connaître les secteurs fermés à la cueillette : **1-800-463-8558.**

Pour connaître les espèces et les limites de prises : **1-800-463-1729.**

.....

NAVIGATION / OBSERVATION DE LA FAUNE

Consultez les pages dédiées aux bonnes pratiques au début de ce guide. Pour en savoir plus :

- Informations sur les marées et cartes marines : www.cartes.gc.ca/
- Informations sur la sécurité nautique : www.tc.gc.ca/securitenautique
- Pour naviguer dans le Parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent : parcmarin.qc.ca/



Ce guide a été élaboré et distribué grâce à la contribution financière de la Fondation Alcoa pour l'environnement.

GUIDE DES ESPÈCES EN PÉRIL | De Sacré-Coeur à Baie-Trinité
PRÉSENTÉ PAR LE COMITÉ ZIP DE LA RIVE-NORD DE L'ESTUAIRE